

H. DE BONVOULOIR.

EX LIBRIS



Silluf o. Bengt-Olof Landin

colok
ET 10

044

975-

244

ENTOMOLOGIA PARISIENSIS;

SIVE

CATALOGUS Insectorum quæ in Agro
Parisiensi reperiuntur ;

*SECUNDUM methodum Geoffræanam in
sectiones , genera & species distributus :*

CUI addita sunt nomina trivalia & fere trecentæ novæ
Species.

*Edente A. F. DE FOURCROY , Doct.
Med. Paris. ; è Reg. Scientiar. Academ. ;
è Reg. Soc. Medic. &c.*

PARS PRIMA.



PARISIIS,

VIA ET ÆDIBUS SERPENTINEIS.

•G. ————— D.

M. DCC. LXXXV.

SUB PRIVILEGIO ACADEMIÆ.

THE JOURNAL OF

PARIS 1813;

1813

THE JOURNAL OF

PARIS 1813;

THE JOURNAL OF

PARIS 1813;

THE JOURNAL OF

PARIS 1813;

THE JOURNAL OF

PARIS 1813;

THE JOURNAL OF

PARIS 1813;

THE JOURNAL OF

PARIS 1813;

THE JOURNAL OF

PARIS 1813;

THE JOURNAL OF

PARIS 1813;

THE JOURNAL OF

PARIS 1813;

THE JOURNAL OF

PARIS 1813;



LECTORI ENTOMOPHYLO

MONITUM EDITORIS.

*J*AM à viginti annis prodiit celeb. Geoffroy de insectis opus eximium, quod multo favore prosecuti sunt historice naturalis cultores. Dudum à plurimis expectabatur manuale Compendium quod nomenclaturam & methodum complectens, omiffâ scilicet historicâ parte, rus deferri posset. Non ergo ingratum entomophylis fore arbitratus est illustr. autor, si catalogus insectorum quæ circa Parisios reperiuntur typis parvâ formâ mandaretur, Botanicon Parisiensis ad instar. Felicissimæ apud cives suos praxeos medicæ curis distractus, hoc quod susceperat opus omnino absolvere non potuit. Entomologiæ olim deditus & autoris auxilio fretus, hunc catalogum

publici juris facere non timui. Methodum ill. Geoffroy, genera, species, descriptivas sententias, religiosè servavi. Trivialia, sæpius Linneana, ipse autor addidit, quæ in magno opere (I) neglexerat. Hæc simul datâ occasione quædam in methodo suâ emendavit, adjecit plurima. Sic genus Eulophi post Tenthredines omnino omissum est, cum sedulâ attentione factâ, Eulophus nihil aliud sit quàm verus Cynips antennis ramosis. Hinc insectum illud inter cynipes nunc incedit. Præterea multæ à viginti annis novæ in agro Parisiensi detectæ sunt insectorum species, quæ ad sua quæque genera revocatæ sunt; sed ut novæ illæ species quæ ducentum & quinquaginta superant à cæteris in historiâ Insectorum in-4^o. descriptis

(I) Hist. abreg. des Insectes, par M. Geoffroy, 2 vol. in-4^o. Paris, 1764.

distinguantur, singulas asterico notandas curavi. Specierum dimensiones, & habitationum loca adjeci; sic ergo quoad numerum specierum & nomenclaturam hic catalogus multo auctior & emendatior magno opere in-4^o. prodit, & hanc illustrationem celeb. Geoffroy omnino deberi fateor. Levia quædam vel addidi, vel mutavi tantum, quæ hic commemorare supervacuum duco; simplicis igitur editoris munus suscepi, utilitatis potius quam gloriæ spe ductus.

Dabam Lutetiæ, mense apr. 1785.



INSECTORUM DIVISIO GENERALIS.

Insecta dividuntur in sex sectiones.

SECTIO I. *Coleoptera*, quorum alæ coleoptris seu elytris teguntur & quibus est os maxillosum.

SECTIO II. *Hemiptera*, quorum alæ superiores elytris accedunt, & quorum os sub thorace est inflexum.

SECTIO III. *Tetraptera alis farinaceis*, quibus sunt quatuor alæ squamulis tectæ.

SECTIO IV. *Tetraptera alis nudis*, quibus alæ quatuor sunt membranaceæ.

SECTIO V. *Diptera*, quibus sunt alæ duæ & halteres sub alarum origine.

SECTIO VI. *Aptera*, quæ carent alis.

Prima autem sectio, coleopterorum scilicet, cum maxime numerosa sit, in articulos & ordines dispertitur.

Articulus primus insecta coleoptera comprehendit quæ coleoptra gerunt integra & dura.

Articulus secundus ex iis componitur quorum coleoptra dura sunt, sed dimidiata, seu semisecta ita ut abdomen non omnino tegant.

Articulus tertius ea exhibet insecta, quorum coleoptra mollia sunt & membranacea.

Ex iis articulis quisque in varios ordines dividitur, prout tarfi insectorum varium referunt articulorum numerum, duos nempe, tres, quatuor aut quinque articulos, vel quinque in primo & secundo pedum pari, quatuor verò in posteriore.

ERRATUM.

Pag. 82, lin. 8, tribus lege tibiis.

*EXTRAIT des registres de l'Académie
des Sciences.*

Du 13 Juillet 1785.

LES Commissaires nommés par l'Académie, lui ayant rendu compte d'un Ouvrage de M. DE FOURCROY, intitulé : *Entomologia Parisiensis*, elle a jugé cet Ouvrage digne de son approbation, & de paroître sous son Privilège.

Je certifie le présent extrait conforme à l'original & aux registres de l'Académie. Le 13 Juillet 1785.

Signé, le Marquis DE CONDORCET.

*EXTRAIT des registres de la Société
Royale de Médecine.*

LA Société Royale de Médecine ayant entendu, dans la séance tenue au Louvre le 23 Juin présent mois, la lecture d'un rapport très-avantageux fait par MM. GEOFFROY & MAUDUYT, sur un Ouvrage de M. DE FOURCROY, intitulé : *Entomologia Parisiensis, sive Catalogus Insectorum quæ circa Lutetiam reperiuntur*, &c. a pensé que cet Ouvrage étoit très-digne de son approbation. En foi de quoi j'ai signé le présent. A Paris, ce 28 Juin 1785.

Signé; VICQ D'AZIR, Secrétaire perpétuel.

ENTOMOLOGIA



ENTOMOLOGIA PARISIENSIS.

PRIMA SECTIO INSECTORUM. *INSECTA COLEOPTERA.*

Caraçteres sectionis.

Abdomen elytris duris tectum:

Maxillæ corneæ laterales.

ARTICULUS PRIMUS.

Caraçt. articuli I.

Elytra integra dura.

ORDO PRIMUS.

Caraçt. Ordin. I.

Tarforum articuli quinque.

A

I. PLATYCERUS. *LE CERF-VOLANT.*

Antennæ in extremo uno versu pectinatæ.

FAMILIA I. *Antennis fractis.*

1. P. Cervus.

Le grand Cerf-volant.

Longueur 21 lignes. Largeur 7 lignes.

P. fuscus, cornubus duobus mobilibus, aspice bifurco, intus ramo denticulisque instructis.

Locus. Habitat silvas & præcipue ilices.

2. P. fœmina cervi.

La grande Biche.

Long. 16 lig. Larg. 6 lig.

P. fuscus, elytris lævibus, capite lævi.

Loc. Larva carie exesos fraxinorum truncos habitat.

3. P. parallelipedus.

La petite Biche.

Long. 9 lig. Larg. 4 lig.

P. niger, elytris lævibus, capitis puncto duplici prominente.

Loc. Habitat arbores cariosas.

4. *P. caraboides.**La Chevrette bleue.*

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

P. violaceo-cœruleus, elytris lævibus.*Varietas A. Platycerus caraboides* latior, superne viridis, inferne fuscus. *La Chevrette verte.**Loc.* Habitat easdem arbores.FAMIL. II. *Antennis integris.*5. *P. striatus.**La Chevrette brune.*Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.*P. fuscus*, capite & thorace punctatis; elytris punctato-striatis.*Loc.* Habitat vetustas arbores.* 6. *P. pygmæus.**Le Cerf-volant mignonette.*Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.*P. nigro fuscus*, elytris striatis, pedibus fuscis, capite brevi, antennis vix apparentibus.*Loc.*

4 ENTOMOLOGIA

II. PTILINUS. *LA PANACHE.*

Antennæ secundum totam longitudinem
uno versu pectinatæ.

1. *P. fuscus.*

La Panache brune.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

P. atro-fuscus, thorace convexo, pedi-
bus antennisque pallidis.

Loc. Habitat vetustas salices quas rotundis for-
minibus larva terebrat.

2. *P. flavescens.*

La Panache jaune.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

P. niger, subvillosus, thorace plano
marginato, elytris flavis mollioribus.

Loc. Habitat flores apertos.

III. SCARABÆUS. *LE SCARABÉ.*

Antennæ clavatæ, clavâ lamellatâ; scu-
tellum inter elytrorum origines.

FAMIL. I. *Antennarum lamellis
septem.*1. *S. nasicornis.**Le Moine.*

Long. 15 lig. Larg. 9 lig.

*S. capite unicorni recurvo, thorace gibbo, abdomine hirsuto.**Loc.* Habitat humum recentem (*les couches*)
& arborum cariem.2. *S. fullo.**Le Foulon.*

Long. 17 lig. Larg. 7 lig.

*S. antennarum lamellis maximis, corpore nigro, squammis albis, varie maculato.**Loc.* Habitat meridionales Galliae provincias;
in musæis frequens.3. *S. melolontha.**Le Hanneton.*

Long. 1 pouce. Larg. 6 lig.

*S. testaceus, thorace villoso, abdominis incisuris lateralibus albis, caudâ inflexâ.**Loc.* Habitat arbores.

6 ENTOMOLOGIA

FAMIL. II. *Antennarum lamellis
tribus.*

4. *S. typhæus.*

Le Phalangiste.

Long. 8 lig. Larg. $4 \frac{1}{2}$ lig.

S. niger, elytris striatis, thorace antrorsum tricorni.

Loc. Habitat bovinas fæces, gallicè *Bouzes de vaches*.

5. *S. auratus.*

L'Émeraüdine.

Long. 9 lig. Larg. 5 lig.

S. viridi-æneus, thoracis parte pronâ, antice prominente.

Loc. Habitat flores præcipue rosæ & pæoniæ.

6. *S. nobilis.*

Le Verdet.

Long. 7 lig. Larg. 4 lig.

S. viridis nitens, thorace infra æquali, non prominente.

Loc. Habitat flores umbellatos.

7. *S. autumnalis.*

Le petit Hanneton d'automne.

Long. 7 lig. Larg. $3 \frac{1}{2}$ lig.

S. testaceus, thorace villoso, elytris luteo-

pallidis, lineis tribus elevatis pallidioribus.

Varietas A. Scarabæus autumnalis omnino viridis.

Loc. Habitat circa arbores.

8. *S. horticola.*

Le petit Hanneton à corcelet vert.

Long. 4 lig. Larg. $2 \frac{2}{3}$ lig.

S. capite thoraceque cœruleo piloso; elytris rufis.

Loc. Habitat bovinas fæces.

9. *S. stercorarius.*

Le grand Pilulaire, le fouille-merde.

Long. 10 lig. Larg. 5 lig.

S. ater, dorso glabro, elytris fulcatis; capitis clypeo rhomboïde, centro prominulo.

Loc. Habitat bovinas fæces.

10. *S. vernalis.*

Le petit Pilulaire.

Long. 7 lig. Larg. 5 lig.

S. cœrulescens, dorso elytrisque glabris lævissimisque, capitis clypeo rhomboïde, centro prominulo.

Loc. Habitat bovinas fæces.

11. *S. subterraneus.**Le Scarabé perlé.*Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.*S. ater*, punctis elevatis, per strias digestis.*Loc.* Habitat arenam sterilem; in urbe Fontainebleau fréquens.12. *S. hæmipterus.**Le Scarabé à tarrière.*

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

S. ater depressus & squamosus, maculis albis variegatus, elytris abdomine brevioribus, femina aculeo ani.*Loc.* Habitat arbores exesas & cortices.13. *S. argenteus.**L'Ecailleux violet.*Long. 4 lig. Larg. 1 lig. $\frac{3}{4}$.*S. violaceus* & squamosus, squamis subtus argenteis.*Loc.* Habitat exesos arborum truncos.14. *S. funerarius.**Le Drap mortuaire.*

Long. 5 lig. Larg. 3 lig.

P A R I S I E N S I S.

S. nigro-cœrulescens, maculis albis sparsis, ordine macularum abdominalium longitudinali.

Loc. Habitat umbelliferarum flores.

15. S. marginatus.

Le Scarabé à bordure.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

S. niger, elytris croceis margine nigro.

Loc.

16. S. fasciatus.

La Livrée d'ancre.

Long. $4 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 lig.

S. niger hirsutie-flavus, elytris luteis, fasciis tribus nigris interruptis.

Loc. Habitat flores umbellatos.

17. S. villosus.

L'Arquelin velu.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

S. villosus albo, nigro flavoque irregulariter variegatus.

Loc.

18. S. bicolor.

Le Scarabé bedeau.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{2}{3}$ lig.

A v

S. capite thoraceque nigro , antennis
elytrisq̃ue rubris.

Loc. Larva & Scarabæus fæces bovinas habitat.

19. S. fimetarius.

Le Scarabé gris des bouzes.

Long. 1 , 2 , 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ 1 , 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. capite thoraceque nigro glabro , elytris
griseis , pedibus pallidis.

Loc. Abundat in bovinis fæcibus.

20. S. fossor.

La Tête armée.

Long. 2 , 3 , 4 , 5 lig. Larg. 1 , 2 , 2 $\frac{1}{2}$ lig.

S. totus niger , spinulis tribus capitis trans-
versim positis.

Loc. Abundat in bovinis fæcibus.

21. S. gagatinus.

Le Scarabé jayet.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

S. totus niger , capite inermi.

Loc. Habitat bovinas fæces.

22. S. fulvescens.

Le Scarabé fauve aux yeux noirs.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

P A R I S I E N S I S. ix

S. fulvus , oculis nigris , thorace glabro.
Loc. Habitat arbuta sepium.

23. S. atratus.

Le Velours noir.

Long. 2 lig. Larg. $1 \frac{1}{3}$ lig.

S. niger hirsutus.

Loc. In horto regio Parisiensi frequens.

24. S. fumosus.

Le Scarabé couleur de suie.

Long. 4 lig. Larg. $1 \frac{3}{4}$ lig.

S. ater , thorace subvillosa , elytris fuscis
striatis.

Loc.

25. S. lamellatus.

Le Scarabé brun chagriné.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

S. atro-fuscus , supra veluti cinerascens ,
antennis pedibusque fuscis , lamellis
antennarum longis , elytris striatis.

Loc.

26. S. aquaticus.

Le Scarabé noir des marais.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

A vj

S. piceus.

Loc. Habitat putridas paludum aquas.

27. *S. natator.*

Le Scarabé nageur.

Long. 2 lig. Larg. $1 \frac{1}{4}$ lig.

S. totus rufo-niger, maculis nigrioribus.

Loc. Habitat rivulos & aquas.

28. *S. perla.*

La Perle aquatique.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

S. subrotundus lucidus, capite thoraceque nigro, elytris pallidis pellucidis.

Loc. Habitat rivulos.

29. *S. putridus.*

Le petit Scarabé noir strié.

Long. $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. niger, pedibus rufis, elytris profunde striatis.

Loc. Habitat putridas plantas.

30. *S. florilegus.*

Le petit Scarabé des fleurs.

Long. $\frac{1}{2}$ lig.

S. nigro-cœrulescens.

Loc. Habitat flores.

* 31. *S. fulcatus.**Le Scarabé à côtes.*Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.*S. ater*, supra costis elevatis striatis.*Loc.*IV. COPRIS. *LE BOUSIER.*

Antennæ clavatæ, clavâ lamellatâ.

Scutellum inter elytrorum origines nullum.

1. *C. lunaris.**Le Bousier capucin.*Long. 8 lig. Larg. 4 $\frac{2}{3}$ lig.*C. capitis* clypeo lunulato, margine elevato, corniculo denticulato.*Loc.* Habitat fimetaria & bovinas fæces rar.2. *C. ferratus.**Le Hottentot.*

Long. 7 lig. Larg. 5 lig.

C. niger; capite clypeato, margine serrato, thorace lato lævi; elytris striatis.*Loc.* Habitat bovinas fæces; rar. in agris luteis.

3. *C. nuchicornis.*

Le petit Bouflier noir cornu.

Long. 3 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2, 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. fusco-niger, capite clypeato angulato, pone cornuto, elytris ferrugineo-nebulosis, brevibus, striatis.

Loc. Habitat bovinas faeces.

4. *C. acornis.*

Le petit Bouflier noir sans cornes.

Long. 2, 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. fusco-niger, capite clypeato angulato, non cornuto, elytris brevibus, striatis.

Loc. Habitat bovinas faeces.

5. *C. conspurcatus.*

Le Bouflier à deux cornes.

Long. 4 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. obscure aeneus, capite pone bicornis, thorace antice prominente, elytris rufis nigro maculatis.

Loc. Habitat bovinas faeces.

6. *C. fulvus.*

Le Bouflier fauve.

Long. 2, 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig.

C. fulvus, capite ænæo, thoracis utrinque cavitate laterali fuscâ.

Loc. Habitat bovinas fæces.

7. C. hæmorrhoidalis.

Le Boufier à points rouges.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{3}{4}$ lig.

C. niger nitidus, thorace antice gibbo duplici, elytro singulo maculâ duplici rubrâ.

Loc. Habitat bovinas fæces.

8. C. sinuatus.

Le Boufier à couture.

Long. 5 lig. Larg. 4 lig.

C. niger, capite clypeato, elytris marginæ exteriori sinuatis.

Loc. Habitat bovinas fæces.

9. C. arachnoides.

Le Boufier araignée.

Long. 4 lig. Larg. $2 \frac{1}{2}$ lig.

C. niger, pedibus longis, femorum posteriorum basi denticulatâ, elytris postice gibbis.

Loc. Idem.

40. *C. corniger.**Le Boufier à cornes retroussées:*Long. $4 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $2 \frac{1}{2}$ lig.*C. niger*, capite pone bicorni, corniculis tenuibus arcuatis, longitudine thoracis, thorace utrinque sinuato.*Loc.* Habitat bovinas fæces.V. ATTELABUS. *L'ESCARBOT.*

Antennæ clavatæ, clavâ integrâ, in medio fractæ.

Caput intra thoracem.

1. *A. unicolor.**L'Escarbot noir.*

Long. 1, 3, 4 lig. Larg. 1, 2, 3 lig.

A. totus niger, elytris lævibus nonnihil striatis.*Loc.* Habitat identidem fæces bovinas, sæpius glaream sterilem.2. *A. bimaculatus.**L'Escarbot à taches rouges.*Long. 1, 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{4}$ lig.*A. niger*, elytro singulo macula rubra.*Loc.* Cum præcedent.

3. A. cupreus.

L'Escarbot bronzé.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

A. nigro-cupreus, capite nonnihil prominulo.

Loc. Cum præcedent.

VI. DERMESTES. *LE DERMESTE.*

Antennæ clavatæ perfoliatæ, ultimo articulo solido gibboso.

Elytra non marginata.

1. D. vespillo.

Le Dermeste à point d'Hongrie.

Long. 9 lig. Larg. 4 lig.

D. thorace marginato, elytris abscissis, nigris, fasciis duabus transversis undulatis in eis.

Loc. Habitat cadavera putrida.

2. D. Listerianus.

Le grand Dermeste noir.

Long. 14 lig. Larg. 6 lig.

D. thorace marginato, elytris abscissis, totus niger.

Loc. Cum præcedente, rarius.

3. *D. bipunctatus.**Le Dermeste à 2 points rouges.*

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. niger, coleoptris punctis rubris binis.*Loc.* Putrida cadavera habitat.4. *D. pellio.**Le Dermeste à 2 points blancs.*Long. 2, 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.*D. niger*, coleoptris punctis albis binis.*Loc.* Habitat hortos & domos.5. *D. lardarius.**Le Dermeste du lard.*

Long. 3 lig.

D. niger, elytris antice cinereis.*Loc.* Habitat partes animalium putridas, muscis ubi pelles conservantur infestus.6. *D. pallidus.**Le Dermeste effacé.*Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*D. nigro-fuscus*, elytris antice pallidioribus nebulosis.*Loc.* Habitat partes animalium putridas, muscis ubi pelles conservantur infestus.

7. *D. murinus.**Le Dermeste à écuillon jaune.*

Long. 2, 3 lig. Larg. 1 lig.

*D. lævis niger, cinereo-nebulosus, scutello luteo.**Loc. Cadavera & exesas arbores habitat.*8. *D. flavescens.**Le Velours jaune.*

Long. 2 lig.

*D. flavescens pilosus, oculis nigris.**Loc. Habitat lignum exesum.*9. *D. oblongus.**Le Dermeste levrier à stries.*Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.*D. oblongus fuscus, elytris striatis.**Loc. Habitat ligneas supellestiles in domis.*10. *D. contractus.**Le Dermeste levrier ponctué & strié.**D. oblongus ferrugineus; elytris punctato-striatis.**Loc. Habitatio præcedentis.*

11. *D. auriculatus.*

Le Dermeste à oreilles.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

D. tentaculis ante oculos antenniformibus mobilibus.

Loc. Vere novo in aquas natat.

12. *D. stercoreus.*

Le Dermeste du fumier.

Long. $\frac{1}{2}$ lig.

D. oblongus, glaber, testaceus, oculis nigris.

Loc. Fimetaria habitat, identidem in domis reperitur.

13. *D. variegatus.*

Le Dermeste panaché.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. nigro fuscoque nebulosus, elytris vix striatis.

Loc. Habitat cortices cariosos.

14. *D. striatus.*

Le Dermeste à côtes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. nigro fuscoque nebulosus, thorace

elytrisque profundè striatis & punctatis.

Loc. Habitat vetustas arbores.

15. *D. aquaticus.*

Le Dermeste bronzé.

Long. $1 \frac{1}{2}$, 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$, 1 $\frac{3}{4}$ lig.

D. viridi-ænæus, thorace fasciis quatuor elevatis, elytris punctato-striatis.

Loc. Conservas rivorum habitat.

16. *D. 4-punctata.*

Le Dermeste à 4 points rouges, strié.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

D. niger, coleoptris punctis rubris quaternis, elytris striatis oblongus.

Loc. Habitat arbores; rarus.

17. *D. hortensis.*

Le Dermeste à 4 points rouges, sans stries.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

D. niger, coleoptris punctis rubris quaternis, elytris lævibus subrotundus.

Loc. Habitat arbores in sylvis & hortis.

18. *D. gagatinus.*

Le Dermeste jayet.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

22 ENTOMOLOGIA

D. niger subrotundus elytris lævibus.
Loc. Habitat flores.

19. D. lugubris.

Le Dermeste en deuil.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. niger subrotundus, elytris striatis.
Loc. Habitat plantas aquaticas.

20. D. longicornis.

Le Dermeste noir à longues antennes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. niger subrotundus, elytris lævibus,
 antennis thorace longioribus.

Loc. Habitat flores.

21. D. fulvipes.

Le Dermeste noir à pattes fauves.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. niger oblongus, elytris punctatis,
 pedibus fulvis.

Loc. Habitat flores.

22. D. pellucidus.

Le Dermeste à étuis transparens.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. elytris corneis pellucidis, thorace
 obscuriore.

Loc. Habitat umbelliferarum flores.

* 23. D. futuratus.

Le Dermeste à couture.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

D. totus niger, subrotundus, thorace elytrisque profunde striatis & punctatis.

Loc.

* 24. D. trifulcus.

Le Dermeste à tête noire.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

D. oblongus, fuscus capite nigro, thorace costis tribus elevatis, elytris striatis.

Loc.

* 25. D. fasciatus.

Le Dermeste à bande noire.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

D. oblongus, niger, pedibus coleoptrisque fulvis, elytrorum fasciâ transversâ nigra.

Loc.

* 26. D. scapularis.

Le Dermeste à épaulettes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. capite thoraceque rubro , elytris nigris, maculis antice extusque rubris.

Loc.

* 27. D. pygmaeus.

Le Dermeste puce.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. ovatus testaceus , subpilosus oculis nigris.

Loc.

* 28. D. thoracicus.

Le Dermeste puce à corcelet rouge.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

D. ovatus , capite , thorace pedibusque rubicundis , elytris nigris.

Loc.

* 29. D. testudinarius.

Le Dermeste-tortue noire.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

D. niger nitens ovatus , elytris postice lividis.

Loc.

* 30. D. tricolor.

Le Dermeste-tortue à tache rouge.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

D.

PARISIENSIS. 25

D. niger nitens ovatus, elytris postice,
antice maculâ rubrâ.

Loc.

* 31. D. tessellatus.

Le Dermeste à l'échiquier.

Lon. $1 \frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. niger; maculis fuscis, plurimis connexis, elytris punctatis.

Loc.

* 32. D. semi-coleopterus.

Le Dermeste noir à étuis courts.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. ater, elytris marginatis brevibus, pedibus fuscis.

Loc.

* 33. D. dimidiatus.

Le Dermeste à demi-étuis.

Long. $1 \frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. niger, elytris dimidiatis pone flavis.

Loc.

VII. BIRRHUS. LA VRILLETTE.

Antennæ articulis tribus ultimis longissimis semi-clavata.

B

1. *B. domesticus.**La Vrilette des tables.*Long. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ lig.*B. testaceo-niger*, thorace subhirsuto.*Loc.* Ligneas supplectiles foraminibus rotundis terebrat.2. *B. paniceus.**La Vrilette de la farine.*Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.*B. testaceus glaber oculis nigris.**Loc.* Habitat cerealia.3. *B. mollis.**La Vrilette fauve.*Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.*B. fulvus obscurus*, oculis nigris.*Loc.* Habitat pinum.4. *B. pertinax.**La Vrilette savoyarde.*Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.*B. totus nigro-fuscus.**Loc.* Habitat ligna tabulata domorum.5. *B. fasciatus.**La Vrilette brune à bandes grises.*Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

B. fuscus, fasciis elytrorum transversis cinereis.

Loc.

6. B. cœrulefcens.

La Vrilette bleuâtre.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

B. totus nigro-cœruleus subvillosus.

Loc.

VIII. ANTHRENUS. L'ANTHRÈNE.

Antennæ clavatæ integræ, clavâ solidâ compressâ.

1. A. scrophulariæ.

L'Anthrène à broderie.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

A. squamosus niger, fasciâ punctisque coleoptorum albis, futuris fuscis,

Loc. Habitat flores, multiplex.

2. A. florilegus.

L'Amourette.

Long. $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. squamosus niger, elytris fuscis, fasciâ triplici undulatâ albâ.

Loc. Larva cadavera habitat, alatus flore

B ij

IX. CISTELA. *LA CISTELE.*

Antennæ extrorsum crassiores nonnihil
perfoliatæ.

Thorax conicus non marginatus.

1. *C. viridescens.*

La Cistele satinée.

Long. 4 lig. Larg. 2 $\frac{2}{3}$ lig.

C. subvillosa viridescens, fasciis longitudinalibus fuscis interruptis.

Loc. Habitat arenam & gramina.

2. *C. atra.*

La Cistele à bande.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C. subvillosa atra, fasciâ elytrorum transversâ aurato-fuscâ.

Loc.

3. *C. nitens.*

La Cistele noire lisse.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. nigra nitens glabra.

Loc.

X. PELTIS. *LE BOUCLIER.*

Antennæ extrorsum crassiores nonnihil
perfoliatæ.

Thorax & elytra marginata.

1. P. atrata.

*Le Bouclier noir à trois raies & cor-
celet lisse.*

Long. 4, 5, 6 lig. Larg. 2, 3, 4 lig.

P. nigra, elytris lineis tribus elevatis,
spatio interjecto punctato, thorace lævi.

Variet. A. ead. spatio interjecto punc-
tato, thorace lævi, utrin-
que sulco armato.

B. ead. spatio interjecto punc-
tato, thorace lævi, ubi-
que æquali.

C. ead. spatio interjecto punc-
tato, thorace lævi, punc-
tis duobus impressis.

D. ead. spatio interjecto punc-
tis latis inæqualibus,
thorace lævi.

Loc. Habitat putrefacta animalium cadavera.

B iij

2. *P. scabra.**Le Bouclier noir à corcelet raboteux.*

Long. 5 , 6 lig. Larg. 2 , 5 lig.

P. nigra, elytris lineis tribus elevatis, spatio interjecto minutissime punctato, thorace scabro.*Loc.* Habitat cadavera, rarior.3. *P. gibbosa.**Le Bouclier à bosses.*

Long. 9 lig. Larg. 4 lig.

P. nigra, elytris lineis tribus elevatis, primâ & secundâ gibbositate connexis, thorace lævi.*Loc.* Habitat cadavera.4. *P. complicata.**Le Bouclier noir chiffonné à corcelet raboteux.*Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.*P. nigra*, elytris lineis tribus elevatis acutis, spatio interjecto veluti complicato, thorace scabro.*Loc.* Habitat cadavera.

5. *P. inæqualis.**Le Bouclier noir chiffonné à corcelet lisse.*

Long. 1 lig. Larg. 2 lig.

P. nigra, elytris lineis tribus elevatis acutis, spatio interjecto veluti complicato, thorace lævi.*Loc.* Habitat cadavera.6. *P. thoracica.**Le Bouclier à corcelet jaune.*Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.*P. nigra*, lineis tribus elevatis acutis, thorace ferrugineo.*Loc.* Habitat cadavera.7. *P. maculata.**Le Bouclier jaune à taches noires.*

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

P. nigra, thorace elytrisque testaceis, thoracis maculâ coleoptrorumque punctis quinque nigris.*Loc.* Habitat cadavera, rarior.8. *P. excavata.**La Goutiere.*

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

P. nigra tota, elytris lævibus, punctis minimis excavatis.

Loc. Habitat ligna humida.

9. P. testacea.

Le Bouclier fauve.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

P. tota testacea.

Loc.

10. P. villosa.

Le Bouclier brun velouté.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

P. nigro-fusca subvillosa.

Loc. Habitat arenam.

XI. CUCUJUS. *LE RICHARD.*

Antennæ ferratæ breves.

Thorax subtus nudus.

Caput dimidium intra thoracem crassum.

1. C. chrysothygma.

Le Richard à fossettes.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

C. aureus, elytrorum fossulis quatuor impressis nitentibus.

Loc. Habitat excelsas arbores; frequenter in insula luteriana *Louvier* dicta reperitur, ad quam cum ligno advehitur, ex sylvis.

2. *C. 8-guttatus.*

Le Richard à points blancs.

Long. 5 lig. Larg. $1 \frac{1}{3}$ lig.

C. viridi-æneus, punctis quatuor impressis albis.

Loc. Idem.

3. *C. rusticus.*

Le Richard doré à stries.

Long. 7 lig. Larg. 1 lig.

C. viridi-auratus, oblongus, thorace punctato, elytris striatis.

Loc. Habitat arbuscula sepium.

4. *C. rubinus.*

Le Richard rubis.

Long. 4 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

C. æneus, elytris fuscis, thorace rubro fasciis fuscis.

Loc. Habitat rosas.

5. *C. viridis.*

Le Richard vert allongé.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

B v

C. viridi-cupreus, lævi oblongus.

Loc. Habitat arbores sepium.

6. *C. minutus.*

Le Richard triangulaire ondé.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. fusco-cupreus, triangularis, fasciis undulatis villosis albidis.

Loc. Idem.

* 7. *C. ater.*

Le Richard noir allongé.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. niger oblongus, punctatus, elytris striatis.

Loc.

* 8. *C. dentatus.*

Le Richard noir chagriné.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. niger thorace punctato, postice dentato, elytris fulcatis.

Loc. Habitat insulas Sequanæ propè locum dictum *le Gros Caillou.*

XII. ELATER. *LE TAUPIN.*

Antennæ ferratæ vel filiformes intra capitis cavitatem subtus receptæ.

Thorax subtus aculeo intra cavitatem abdominis recepto.

1. *E. ruber.*

Le Taupin rouge.

Long. 3 lig. Larg. 3 lig.

E. thorace elytrisque rubris.

Loc. Habitat cariosas salices.

2. *E. sanguineus.*

Le Taupin à étuis rouges.

Long. 5 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

E. niger, elytris rubris.

Loc. Habitat cortices arborum.

3. *E. flavescens.*

Le Taupin à étuis jaunes & corcelet lisse.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

E. niger, elytris flavis.

Varietas A. niger, elytris omnino flavis.

B. niger, elytris flavis apice nigris.

B vj

C. niger, elytris testaceo-fuscis.

Loc. Habitat vetustas arbores.

4. E. castaneus.

Le Taupin à corcelet velouté.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

E. thorace villosa, elytris testaceis apice nigris.

Varietas A. thorace villosa, elytris flavescens apice nigris.

B. thorace villosa, elytris rubescens apice nigris.

Loc. Idem.

5. E. ruficollis.

Le Taupin noir à corcelet rouge.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

E. niger, thorace rubro.

Loc.

6. E. cruciatus.

Le Taupin porte-croix.

Larg. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

E. thorace nigro , circulo rubro , ely-
tris fulvis , cruce-nigra.

Loc.

7. E. pectinicornis.

Le Taupin brun cuivreux.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

E. fusco-viridi-æneus.

Loc. Habitat gramina.

8. E. niger.

Le Taupin brun nébuleux.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

E. nigro-fuscus , cinereo-nebulosus.

Loc. Habitat messes.

9. E. tessellatus.

Le Taupin à plaques velues.

Long. 5 lig. Larg. $1 \frac{2}{3}$ lig.

E. niger , villosus undulatus.

Loc. Habitat agros.

10. E. murinus.

Le Taupin gris de souris.

Long. 4, 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

E. niger , elytris villosus - murinis.

Loc.

11. *E. balteatus.**Le Taupin bedeau.*

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

E. niger, elytris fuscis, singulo fasciâ longitudinali fulvâ.*Loc.* Habitat arva.12. *E. obscurus.**Le Taupin noir à étuis bruns.*

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

E. niger, elytris fuscis.*Loc.* Idem.13. *E. ater.**Le Taupin en deuil.*Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.*E. totus niger nitidus.**Loc.* Idem.14. *E. rufipes.**Le Taupin noir à pattes fauves.*Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*E. niger pedibus rufis.**Loc.* Habitat cortices.15. *E. bimaculatus.**Le Taupin noir à taches rouges.*

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

E. niger elytrorum basi maculis rubris.
Loc. Habitat cortices.

16. *E. clavicornis*.

Le Taupin à antennes en masse;

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

E. fuscus, antennis ferrato-clavatis.

Loc. Habitat sylvas.

* 17. *E. rachifer*.

Le Taupin à bandes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

E. niger, elytris fulvis, rachi nigra.

Loc.

* 18. *E. melanophthalmos*.

Le Taupin fauve aux yeux noirs.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

E. fuscus, oculis nigris.

Loc.

* 19. *E. fuscus*.

Le Taupin brunet.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

E. totus fuscus, thorace punctato, elytris striatis.

Loc.

- * 20. *E. villosus.*

Le Taupin brun velouté.

Long. 9 lig. Larg. 2 lig.

E. fulvus vellere levi fasciatim confusus.

Loc.

XIII. BUPRESTIS. *LE BUPRESTE.*

Antennæ filiformes.

Trochanter magnus seu appendix ad basim femorum posteriorum.

FAMIL. I. *thorace cordato capite latiore elytris angustiore.*

1. *B. coriaceus.*

Le Bupreste noir chagriné.

Long. 14 lig. Larg. 6 lig.

B. ater, elytris rugosis.

Loc. Habitat humida hortorum loca.

2. *B. nitens.*

Le Bupreste doré & sillonné à larges bandes.

Long. 11 lig. Larg. 4 lig.

B. viridis, elytris obtuse sulcatis, non

punctatis, pedibus antennisque ferrugineis.

Loc. Habitat frequentissimè hortos & agros.

3. *B. granulatus.*

Le Bupreste galonné.

Long. 11 lig. Larg. 5 lig.

B. niger, elytris æneis convexe punctatis striatisque.

Varietas A. totus violaceus, elytris convexe punctatis striatisque.

Loc. Idem. rarior.

4. *B. purpurascens.*

Le Bupreste azuré.

Long. 11 lig. Larg. 5 lig.

B. totus nigro-violaceus, elytris dense striatis.

Varietas A. Elytro singulo striis XVI, oris aureo-cupreis.

B. Elytro singulo striis XVI, tribus interruptis.

C. Elytro singulo striis XXII, tribus interruptis.

Loc. Habitat hortos humidos.

5. *B. fycophanta.**Le Bupreste quarré couleur d'or.*

Long. 7 lig. Larg. 3 lig.

B. nigro-violescens, elytris latis æneis è viridi purpureis, singulo striis sexdecim.*Loc.* Habitat ilicem, ubi papilionum larvas devorat.6. *B. antiquus.**Le Bupreste quarré couleur de bronze antique.*

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

B. totus è fusco-viridi cupreus, elytris latis, singulo striis sexdecim.*Loc.* Idem.7. *B. leucophthalmos.**Le Bupreste tout noir.*Long. 8 lig. Larg. 3 $\frac{3}{4}$ lig.*B. ater*, elytro singulo striis octo lævibus, pedibus nigris.*Loc.* Idem.* 8. *B. longicornis.**Le Bupreste luisant.*Long. 10 lig. Larg. 3 $\frac{1}{2}$ lig.*B. ater*, elytro singulo striis octo lævi-

bus vix impressis pedibus nigris,
antennis fuscis, thorace duplo lon-
gioribus.

Loc. Idem.

9. B. rufipes.

Le Bupreste noir à pattes rougeâtres.

Long. 4, 5 lig. Larg. 2 lig.

B. niger, elytro singulo striis octo punc-
tatis, pedibus ferrugineis.

Loc. Idem.

10. B. flavipes.

Le Bupreste noir à pattes jaunes.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

B. niger, elytro singulo striis octo lavi-
bus, pedibus lividis.

Loc. Idem.

11. B. vinearum.

Le Bupreste à six points enfoncés.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

B. nigro-viridis, elytro singulo striis octo
punctis tribus impressis.

Loc. Habitat vites,

12. *B. agrorum.*

*Le Bupreste vert pointillé à huit stries
& pattes fauves.*

Long. 4 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

B. viridis punctatus, elytro singulo striis octo, pedibus pallidis.

Loc. Habitat agros.

13. *B. lucorum.*

*Le Bupreste vert lisse, à huit stries
& pattes fauves.*

B. viridis nitens; elytro singulo striis octo, pedibus pallidis, punctis tribus impressis.

Loc. Habitat sylvas aridas.

14. *B. bicolor.*

Le Bupreste à étuis verts & bruns.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

B. viridis, elytro singulo striis octo, pedibus elytrorumque anticâ parte & margine fulvis.

Loc. Habitat arenam.

15. B. 6-punctatus.

Le Bupreste à étuis cuivreux.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

B. nitens, capite thoraceque viridi, elytris cupreis punctulis duodecim.

Loc. Habitat arenam, propè rivulos.

16. B. thoracicus.

Le Bupreste à corcelet cuivreux.

Long.

B. nitens, capite elytrisque viridibus, thorace cupreo, punctis duodecim.

Loc. Idem.

17. B. cyano-cephalus.

Le Bupreste bleu à corcelet rouge.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

B. capite elytrisque cæruleis, thorace rubro.

Loc. Idem.

18. B. equestris.

Le Chevalier noir.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

B. niger, thorace atro, elytris rubris cruce nigrâ.

Loc. In loco dicto Fontainebleau frequens.

19. B. crux major.

Le Chevalier rouge.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

B. niger, thorace pedibusque rubris elytris rubris, cruce nigra.

Loc.

20. B. crepitans.

Le Bupreste à tête, corcelet & pattes rouges & étuis bleus.

Long.

B. capite, thorace, pedibusque rubris, elytris cæruleo-nigris.

Loc. Habitat humura umbrosum, sub lapidibus.

21. B. ustulatus.

Le Bupreste quadrille à corcelet rond & étuis striés.

Long. 1 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{1}{2}$, 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$, 1 lig.

B. niger, thorace ovato, nigro, elytris striatis maculis quatuor lividis.

Loc. Habitat rivorum ripas.

22. B. 4-maculatus.

Le Bupreste quadrille à corcelet plat & étuis lisses.

Long. idem. Larg. idem.

B. niger, thorace plano ferrugineo, elytris lævibus, maculis quatuor lividis.

Loc. Idem.

23. B. crucifer.

Le Bupreste quadrille à corcelet plat, brun & étuis striés.

Long. idem. Larg. idem.

B. niger, thorace plano ferrugineo, elytris striatis, maculis quatuor lividis.

Loc. Idem.

24. B. quadrifer.

Le Bupreste quadrille à corcelet plat & noir & étuis striés.

B. niger, thorace plano nigro, elytris striatis, maculis quatuor lividis.

Loc. Idem.

25. B. octo-maculatus.

Le Bupreste noir à huit taches fauves.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

B. niger, elytris striatis, maculis octo lividis.

Loc. Habitat arenam

26. *B. fulvus.**Le Bupreste fauve à tête noire.*Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*B. testaceus*, capite nigro.

Loc. Idem.

27. *B. minutus.**Le Bupreste noir sans stries.*Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.*B. totus niger*, lævis.

Loc. Habitat arenam.

FAMIL. II. *Thorace capite elytrisque angustiore.*28. *B. campestris.**Le Velours vert à 12 points blancs.*Long. 6 lig. Larg. $2\frac{1}{2}$ lig.*B. inauratus*, supra viridis, coleoptris punctis duodecim albis.

Loc. Habitat loca sicca, arenam.

* 29. *B. episcopalis.**Le Bupreste épiscopal.*Long. 4 lig. Larg. $1\frac{1}{2}$ lig.

B.

B. totus violaceus, pedibus antennisque fuscis.

Loc. Idem.

30. B. fasciatus.

Le Bupreste à broderie blanche.

Long. 6 lig. Larg. $2\frac{1}{2}$ lig.

B. inauratus, supra fusco-viridis, coleoptris fasciis sex undulatis albis.

Loc. Idem.

* 31. B. futuratus.

Le Bupreste à bandes.

Long. $1\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

B. niger; elytris striatis, coleoptrorum anticâ parte futurâque lividis.

Loc.

32. B. germanicus.

Le Bupreste vert à 6 points blancs.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

B. inauratus, supra fusco-viridis, coleoptris punctis sex albis.

Loc. Habitat arenam, prope rivulos.

* 33. B. marginatus.

Le Bupreste bordé.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

B. fulvus, oculis nigris; elytris nigris, postice fulvis.

Loc.

34. B. riparius.

Le Bupreste à mamelons.

Long. 2 $\frac{1}{2}$, 3 lig. Larg. 1 lig.

B. viridi-æneus, elytris punctis latis excavatis mammillofis.

Loc. Habitat arenam humidam.

* 35. B. scapularis.

Le Bupreste taché à corcele rouge.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

B. testaceus, capite nigro : elytris striatis nigris utrinque maculâ antice fulvâ.

Loc.

36. B. aquaticus.

Le Bupreste à tête cannelée.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

B. fusco-æneus, capite profunde striato, elytrorum striâ primâ remotissimâ.

Loc. Habitat arenam humidam.

37. B. contractus.

Le Bupreste levrier.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

B. niger, elytris fulvis striatis, femoribus latis, pedibus valde spinosis.

Loc.

38. B. impressus.

Le Bupreste à 4 points enfoncés.

Long. $1 \frac{1}{2}$, 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$, 1 lig.

B. cupreo viridique variegatus, punctis quatuor impressis, pedibusque pallidis.

Loc. Habitat arenam prope rivulos.

* 39. B. lunulatus.

Le Bupreste à lunules.

Long. $1 \frac{2}{3}$ lig. Larg.

B. niger, elytris striato punctatis; postice maculis duabus, & apice flavis.

Loc.

40. B. stagnorum.

Le Bupreste bronzé à 2 points enfoncés.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

B. fusco-æneus elytris striatis, punctis duobus impressis.

Loc. Habitat arenam humidam, rarior.

* 41. *B. foveatus.*

Le Bupreste strié à 4 points enfoncés.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

B. totus niger, elytris striatis, punctis quatuor impressis.

Loc.

FAM. III. *Thorace capite latiore, elytrorum latitudine.*

42. *B. piger.*

Le Bupreste paresseux.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

B. ater, thorace lato, elytrorum striis punctatis.

Loc. Habitat siccam arenam.

* 43. *B. capitatus.*

Le Bupreste brun à tête noire.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

B. totus fuscus, capite nigro.

Loc.

44. *B. viridulus.*

Le Bupreste vert.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

B. totus viridis , thorace lato.

Loc.

* 45. B. maxillofus.

Le Quadrille à mâchoires brunes.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

B. niger maxillis thoraceque ferrugineis :
elytris striatis , maculis quatuor luteis.

Loc.

46. B. vulgaris.

Le Bupreste rosette.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

B. infra niger , supra nigro-æneus , tho-
race lato.

Loc. Habitat arenam.

* 47. B. plateofus.

Le Bupreste à plaques.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

B. capite cœruleo-nitido , thorace fulvo ;
elytris luteis striatis maculis sex atris.

Loc.

48. B. luctuosus.

Le Bupreste en deuil.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C iiij

B. totus niger, thorace lato lævi, elytrorum striis lævibus.

Loc. Habitat humum sub lapidibus.

* 49. B. fumosus.

Le Bupreste noir à pattes brunes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

B. totus niger, elytris striatis, pedibus fuscis.

Loc.

50. B. fericeus.

Le Bupreste noir velouté.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

B. ater subvillosus, antennis pedibusque ferrugineis.

Loc. Habitat agros.

51. B. æruginosus.

Le Bupreste cuivreux à pattes brunes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

B. totus nigro-auratus, elytris striatis, pedibus fuscis.

Loc.

52. *B. leporinus.**Le Bupreste noir à pattes brunes.**B. ater*, lævis, pedibus antennarumque
basi ferrugineis.*Loc.** 53. *B. connexus.**Le Bupreste à suture.*

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

B. niger, pedibus fulvis : elytris fulvis
futurâ margineque postico nigris.*Loc.*54. *B. psittaceus.**Le Bupreste perroquet.*

Long. 5, 3 lig. Larg. 2, 1 lig.

B. totus viridi cupreus, antennis nigris.*Loc.* Habitat agros & hortos, frequentissimus.55. *B. variegatus.**Le Bupreste vert à bordure.*Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.*B. viridis*, pedibus elytrorumque mar-
gine exteriori pallide testaceis.*Loc.* Habitat agros.

56. *B. melanocephalus.**Le Bupreste noir à corcelet rouge.*Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.*B. niger*, thorace, antennis pedibusque ferrugineis.*Loc.* Habitat agros.57. *B. rubescens.**Le Bupreste fauve.*Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.*B. ferrugineo-lividus*, elytris punctato-friatis.*Loc.** 58. *B. rosaceus.**Le Bupreste rouget.*

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

B. niger lævis, thorace antennis pedibusque rubris.*Loc.** 59. *B. rusticus.**Le Bupreste brunet.*

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

B. niger punctatus, thorace capite antennis pedibusque fuscis.*Loc.*

* 60. *B. humeralis.*

Le Bupreste à nœud d'épaule.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

B. niger striatus, pedibus pallidis, elytrorum basi maculâ flavâ.

Loc.

XIV. BRUCHUS. *LA BRUCHE.*

Antennæ filiformes.

Thorax subrotundus gibbus.

Corpus sphæroidæum, dorso convexo.

1. *B. fur.*

La Bruche à bandes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

B. testaceus, elytrorum fasciâ duplici albidâ.

Loc. Habitat herbaria, plantas siccas devorat.

2. *B. apterus.*

La Bruche sans aîles.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

B. totus testaceus, elytris coadunatis.

Loc. Habitat plantas siccas.

C v.

* 3. *B. cruciatus.**La Bruche à croix de S. André.*

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

*B. fuscus subvillosus, scutello albo, elytris cruce divaricatâ albidâ.**Loc.*XV. LAMPYRIS. *LE VER-LUISANT.*

Antennæ filiformes.

Caput clypeo thoracis marginato tectum.

Abdominis latera plicato-papillosa.

1. *L. nocticula.**Le Ver-luisant à femelle sans ailes.*Le mâle. Long. 3 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.La femelle. Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.*L. fœminâ apterâ.**Loc.* Fœmina abdomine nudo campos habitat, mas in hortis volitat per noctem.2. *L. hemiptera.**Le Ver-luisant à demi-fourreaux.*Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*L. hemiptera.**Loc.* Idem.

3. *L. fanguinea.**Le Ver-luisant rouge.*Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.*L. elytris rubris, thorace rubro, nigrâ maculâ.**Loc. Idem.*XVI. CICINDELA. *LA CICINDELE.*

Antennæ filiformes.

Thorax planus, marginatus.

Caput detectum.

Elytra flexilia.

1. *C. fusca.**La Cicindele noire à corcelet maculé.*Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.*C. elytris nigricantibus thorace rubro, nigrâ maculâ.**Loc. Habitat flores.*2. *C. livida.**La Cicindele à corcelet rouge.*Long. 5, 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.*C. thorace rubro immaculato, genibus posticis nigris.*

Varietas A. elytris testaceis, thorace rubro immaculato, genubus posticis nigris.

B. elytris nigricantibus, thorace rubro immaculato, genubus posticis nigris.

Loc. Habitat flores.

3. *C. nigra.*

La petite Cicindele noire.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. elytris nigricantibus, thorace rubro immaculato, genubus omnibus rubris.

Loc. Idem.

4. *C. pallida.*

La petite Cicindele pâle.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. elytris testaceis, thorace rubro immaculato, genubus omnibus rubris.

Loc. Idem.

5. *C. maculata.*

La Cicindele à étuis tachés de noir.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. rubra, elytris testaceis, apice nigris.
Loc. Habitat flores.

6. *C. lutescens.*

La Cicindele noire à étuis jaunes.

Long. 2, 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. nigra, elytris pedibusque pallidis.

Varietas A. nigra, thorace omnino nigro, elytris pedibusque pallidis.

B. nigra, thoracis margine flavo, elytris pedibusque pallidis.

Loc. Idem.

7. *C. ænea.*

La Cicindele bedeau.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. viridi-ænea, elytris extrorsum rubrīs.
Loc. Idem.

8. *C. bipustulata.*

La Cicindele verte à points rouges.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. æneo-viridis, elytris apice rubris.
Loc. Habitat flores.

9. *C. elegans.**La Cicindele verte à points jaunes.**C. æneo-viridis*, elytris apice flavis.*Varietas A. tota æneo-viridis,*
elytris apice flavis.*B. cœruleo-viridis,* tho-
racis margine rubro,
elytris apice flavis.*Loc. Habitat flores.*10. *C. minima.**La Cicindele noire à points jaunes*
*& corcelet rouge.*Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.*C. fusca*, elytris apice flavis, thorace
rubro nigrâ maculâ.*Loc. Idem.*11. *C. biguttata.**La Cicindele noire à points jaunes*
*& corcelet noir.**C. fusca*, elytris apice flavis, thorace
fusco.*Loc. Idem.*

12. *C. fasciata.**La Cicindele à bandes rouges.**C. elytris nigris, fasciis duabus rubris.**Loc. Habitat flores.*13. *C. thoracica.**La Cicindele verte à corcelet rouge.*Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*C. viridis, thorace rubro immaculato.**Loc. Idem.*14. *C. viridi-cœrulea.**La Cicindele verdâtre.*

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

*C. viridi-cœrulea.**Varietas A. viridis.**B. cœrulea.**C. viridi-cœrulea.**Loc. Idem.*15. *C. plumbea.**La Cicindele plombée.*Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.*C. plumbeo-nigra.**Loc. Idem.*

16. *C. cinerea.**La Cicindele cendrée.*Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.*C. villoso-cinerea.**Loc.* Habitat flores.17. *C. rotundata.**La Cicindele bronzée.*

Long. 1 lig.

C. plumbeo-cuprea, tibiis pallidis, abdomine subrotundo.*Loc.* Idem.XVII. OMALISUS. *L'OMALISE.*

Antennæ filiformes.

Thorax planus tetragonus, angulis posterioribus in spinam productis.

1. *O. fontis bellaquæi.**L'Omalise.*Long. 2 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. 1 lig.*Loc.* Habitat fontem bellaquæum.

XVIII. HYDROPHILUS. *L'HYDROPHILE.*

Antennæ clavatæ perfoliatæ antennulis breviores.

Pedes natatorii.

1. *H. picæus.*

Le grand Hydrophile.

Long. 17 lig. Larg. 9 lig.

H. niger, elytris fulcatis, antennis fuscis.

Loc. Habitat rivulos & stagna.

2. *H. caraboides.*

L'Hydrophile noir picoté.

Long. 7 lig. Larg. 3 lig.

H. niger, elytrorum punctis per strias digestis, antennis nigris.

Loc. Habitat aquas.

3. *H. punctatus.*

L'Hydrophile lisse à points.

Long. 2 lig. Larg. 2 lig.

H. niger, elytris lævibus dense punctatis.

Loc. Idem.

4. *H. fuscipes.**L'Hydrophile noir strié.*Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.*H. niger*, elytris striatis, pedibus fuscis.*Loc.* Habitat aquas.5. *H. fulvus.**L'Hydrophile fauve.*

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

*H. fulvus.**Loc.* Idem.XIX. DYTICUS. *LE DITIQUE.*

Antennæ filiformes, capite longiores.

Pedes natatorii.

1. *D. stagnalis.**Le Ditique brun à bordure.*

Long. 8 lig. Larg. 4 lig.

D. fuscus, margine coleoptorum thoracisque flavo.*Loc.* Habitat stagnantes aquas.2. *D. marginalis.**Le Ditique noir à bordure.*

Long. 1 pouce. Larg. 6 lig.

D. niger, margine coleoptorum thoracisque flavo.*Loc.* Habitat stagna.

3. D. semifstriatus.

Le Ditique demi-silloné.

Long. 14 lig. Larg. 7 lig.

D. elytris striis viginti dimidiatis.

Loc. Habitat aquas.

4. D. cinereus.

Le Ditique à corcelet à bandes.

Long. 7 lig. Larg. 4 lig.

D. cinereus, margine coleoptorum flavo, thoracis medietate flavâ.

Loc. Habitat stagna.

5. D. fulcatus.

Le Ditique silloné.

Long. 6 lig. Larg. 4 lig.

D. elytris fulcis decem longitudinalibus, thoracis medietate flavâ.

Loc. Idem.

6. D. luctuosus.

Le Ditique en deuil.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

D. totus niger lævis.

Loc. Idem.

7. *D. tessellatus.**Le Ditique fauve à taches noires.*Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.*D. fulvus*, maculis sparsis nigris.

Loc. Habitat aquam.

8. *D. variegatus.**Le Ditique à bordure panachée.*

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. fuscus, elytris antice & externe flavis.

Loc. Idem.

9. *D. lividus.**Le Ditique noir à étuis bruns.*

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. ater, elytris fuscis.

Loc. Idem.

10. *D. ovatus.**Le Ditique sphérique.*Long. 2 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.*D. ovatus fuscus*, capite thoraceque rubicundis.

Loc. Idem.

11. *D. melanophthalmos.**Le Ditique aux yeux noirs.*Long. $1 \frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

D. flavo-fuscus , oculis nigris , elytris
lævibus.

Lo. Habitat aquas stagnantes.

12. D. thoracicus.

Le Ditique strié à corcelet jaune.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. cinereus , capite nigro , thorace luteo , elytris nigro-maculatis punctato-striatis.

Loc. Habitat stagna.

13. D. quadratus.

Le Ditique panaché sans stries.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

D. niger , thorace flavo , elytris lævibus , maculis limboque luteis.

Loc. Idem.

14. D. monostriatus.

Le Ditique à une seule strie.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

D. niger , elytris maculis & limbo luteis , striâ unicâ.

Loc. Idem.

15. *D. clavi-cornis.**Le Ditique à grosses antennes.*

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. fuscus, capite thoraceque fulvo, antennis subclavatis, scutello nullo.*Loc.* Habitat aquas stagnantes.* 16. *D. hebraicus.**Le Ditique hébraïque.*Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.*D. niger*, capite thoraceque antice flavis, elytris lævibus, maculis aliquot luteis, nonnullis connexis.*Loc.* Habitat stagna.* 17. *D. punctatus.**Le Ditique picoté.*Long. 5 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.*D. thorace flavo maculâ nigrâ*, elytris fuscis punctis nigris confertis.*Loc.* Habitat aquas.* 18. *D. marmoratus.**Le Ditique marbré.*

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. fusco-pallidus, elytris externe maculis obliquis lineisque albidis.

Loc. Habitat rivulos & stagna.

XX. GYRINUS. *Le Tourniquet.*

Antennæ rigidæ, capite breviores.

Pedes natatorii.

Oculi quatuor.

1. C. natator.

Le Tourniquet.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

Loc. Habitat aquarum superficiem quam per orbem concentricos vivacissime peragrat.

ORDO SECUNDUS.

Caract. Ordinis II.

Tarforum articuli quatuor.

XXI. MELOLONTA. *La Melolonte.*

Antennæ ferratæ ante oculos positæ.

1. M. quadri-punctata.

La Melolonte quadrille à corcelet noir.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

M. coleoptris rubris, maculis quatuor
nigris, thorace nigro.

Loc. Habitat pruni sylvestris folia.

2. *M. rubra.*

*La Melolonte quadrille à corcelet
rouge.*

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

M. coleoptris rubris, maculis quatuor
nigris, thorace rubro nigrâ maculâ.

Loc. Habitat prunum sylvestrem.

3. *M. pallida.*

La Melolonte lisette.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

M. nigro-viridis, elytris luteo-pallidis.

Loc. Habitat sylvas.

4. *M. cœrulea.*

La Melolonte bleuette.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. cœrulea, thorace pedibusque ferru-
gineis.

Loc. Idem.

5. *M. muscoides.*

La Melolonte mouche.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. 1 lig.

M.

M. viridi-cœruleo, thorace rubro cœruleâ maculâ, tibiis ferrugineis.

Loc. Habitat sylvas.

6. M. cuprea.

La Melolonte cuivreuse.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. oblonga nigro-cuprea, subvillosâ elytris punctatis.

Loc. Idem.

XXII. PRIONUS. *LE PRIONE.*

Antennæ ferratæ in oculo positæ.

1. P. coriarius.

Le Prione.

Long. 15 lig. Larg. 9 lig.

Loc. Habitat sylvas, larva arborum truncos.

XXIII. CERAMBYX. *LE CAPRICORNE.*

Antennæ à basi ad apicem decrescen-
tes, in oculo positæ.

Thorax aculeatus.

1. C. cerdo.

Le grand Capricorne noir.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ pouce. Larg. 6 lig.

C. fusco-niger, elytris rugosis, apice

interiore spinosis, antennis corpore longioribus.

Loc. Larva truncos arborum habitat; cerambix sylvas.

2. *C. piceus.*

Le petit Capricorne noir.

Long. 9 lig. Larg. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

C. ater, elytris rugosis integris, antennis corpore longioribus.

Loc. Idem.

3. *C. textor.*

Le Capricorne noir chagriné.

Long. 1 pouce. Larg. 5 lig.

C. ater, elytris punctis elevatis, antennis corpore brevioribus.

Loc. Idem.

4. *C. alpinus.*

La Rosalie.

Long. 15 lig. Larg. 4 lig.

C. cinereo-cærulescens, elytrorum maculis sex fuscis.

Loc. Habitat exesos arborum truncos.

5. *C. moschatus.*

Le Capricorne vert à odeur de rose.

Long. 1 pouce. Larg. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

C. viridi-cœrulescens.

Loc. Habitat truncos & folia falicis.

6. C. ruber.

Le Capricorne rouge.

Long. 8 lig. Larg. $2\frac{2}{3}$ lig.

C. niger, elytris thoracisque lateribus rubris.

Loc. Habitat truncos arborum.

7. C. monilis.

Le Capricorne noir marbré de gris.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. niger, elytris vellere cinereo marmoratis, antennis pedibusque cinereo intersectis.

Loc. Habitat falices.

8. C. fasciatus.

Le Capricorne ovale cendré.

Long. 6 lig. Larg. $2\frac{1}{2}$ lig.

C. ater ovatus, antennis corpore dimidiis brevioribus, elytris vellere cinereo albidis.

Varietas A. elytris fuscis vellere cinereo fasciatis.

Loc. Habitat sepium arbuta.

9. *C. hispidus.**Le Capricorne à étuis dentelés.*Long. 3 lig. Larg. 1 , 1 $\frac{1}{3}$ lig.*C. ovatus, fuscus, elytris antice cinereis, apice bidentatis.**Loc.* Habitat pratorum gramina.10. *C. ovatus.**Le Capricorne brun de forme ovale.*Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.*C. ovatus fuscus, elytris integris.**Loc.* Idem.11. *C. compressus.**Le Capricorne applati.*Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*C. niger, compressus, scaber, thorace utrinque serrato, pedibus fulvis.**Loc.** 12. *C. dentatus.**Le Capricorne à pointes.*Long. 2 $\frac{1}{5}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.*C. fusco-nebulosus, elytris antice cinereis, apice unidentatis.**Loc.*

13. *C. nebulosus*.*Le Capricorne nébuleux.*Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*C. fusco-nebulosus*, elytris antice thoracisque medio subcinereis, ^o lytris integris.*Loc.*

XXIV. LEPTURA. LA LEPTURE.

Antennæ à basi ad apicem decrescentes, in oculo positæ.

Thorax inermis.

FAMIL. I. *Thorace cylindraceo.*1. *L. carcharias*.*La Lepture chagrinée.*

Long. 1 pouce. Larg. 4 lig.

L. cinerea, nigro-punctata, thorace cylindraceo.*Loc.* Habitat truncos arborum.2. *L. subcœrulea*.*La Lepture ardoisée.*Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.*L. tota cœruleo-atra*, capite thoraceque subvillosa.*Loc.* Habitat flores.

3. *L. betulina*.

*La Lepture à corcelet cylindrique
& taches jaunes.*

Long. 4, 5, 6 lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{2}$ lig.

L. nigra, thoracis lineis tribus, elytrorumque maculis villoso-flavis, thorace cylindraceo, antennis corpus æquantibus.

Loc. Habitat betulam.

4. *L. pilosa*.

La Lepture noire à étuis jaunes.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{2}$ lig.

L. nigra; elytris flavis, apice nigris.

Loc. Habitat hortos.

5. *L. oculata*.

La Lepture aux yeux de Paon.

Long. 5 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

L. nigro-cinerea, thorace elytrisque maculis oculiferis atris, circulo cinereo, thorace subcylindraceo.

Loc. Habitat hortos, rara, in horto regio inventa.

* 6. *L. nebulosa*:

La Lepture nébuleuse.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

L. fusca, subvillosa, maculis cinereis marmorata.

Loc.

7. L. ferruginea.

La Lepture rouillée.

Long. 17 lig. Larg. 5 lig.

L. tota nigro-ferruginea, thorace subcylindraceo.

Loc. Habitat sylvas.

* 8. L. fulvipes.

La Lepture à pattes fauves.

Long. 6 lig. Larg. $1 \frac{1}{4}$ lig.

L. atra, punctata, pedibus flavis, thorace cylindraceo.

Loc. Habitat agros fontis-Bellaquæi.

FAMIL. II. *Thorace globoso.*

9. L. variegata.

La Lepture à corcelet rond & taches jaunes.

Long. $6 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

L. nigra, maculis villosa-flavis, thorace globoso, antennis corporis dimidio brevioribus.

Loc. Habitat hortos.

10. *L. villosa*.*La Lepture velours jaune.*

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

L. nigra, villosa-flava, maculis duabus
in elytro singulo glabris nigris.*Loc.* Habitat flores.11. *L. punctata*.*La Lepture à corcelet rouge ponctué.*

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

L. nigricans, capite thoraceque rubro;
punctis nigris.*Loc.* Habitat hortos.12. *L. arcuata*.*La Lepture aux croissants dorés.*Long. 5, 6, 8 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig.*L. nigra*, elytrorum lineis quatuor ar-
cuatis, punctisque flavis, pedibus
testaceis.*Loc.* Habitat arborum truncos.13. *L. arietis*.*La Lepture à trois bandes dorées.*

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

L. nigra, elytrorum lineis tribus transver

sis punctisque flavis , pedibus testaceis.

Loc. Habitat flores.

14. *L. rustica.*

La Lepture à raies blanches.

Long. 2 $\frac{1}{2}$, 4 lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. nigra, elytrorum lineis transversis punctisque albis.

Loc. Habitat umbelliferarum flores.

15. *L. signata.*

La Lepture noire à étuis gris tachés de jaune.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

L. nigra, elytris pallido-fuscis, signaturis flavis.

Loc. Habitat flores.

16. *L. gammoides.*

La Lepture jaune à bandes noires.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

L. villosa-flava, elytris lineis tribus transversis nigris.

Loc. Idem.

17. *L. mystica.*

La Lepture arlequine.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

L. nigra, elytris maculis testaceis, nigris, albidis, lineisque nigris & albicantibus variegatis.

Loc. Rar. hab. hortos, in regio horto inventa.

18. *L. cyanea*.

La Lepture bleue.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

L. cœrulea, tribus rufis thorace subglobofo.

Loc. Habitat arborum truncos.

FAMIL. III. *Thorace inæquali scabro.*

19. *L. quadri-punctata*.

La Lepture brune à corcelet rhomboïdal.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

L. testaceo-fusca, thorace rhomboidali villôfo, elytrorum maculis quatuor albidis transversim positis.

Loc. Habitat arbores.

* 20. *L. vidua*.

La Lepture veuve.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig.

L. tota atra, dense punctata.

Loc. Habitat arbores.

21. L. testacea.

La Lepture livide à corcelet lisse.

Long. 4 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

L. testacea, thorace glabro.

Loc. Habitat flores.

* 22. L. punctuosa.

La Lepture maroquinée.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{3}{2}$ lig.

L. atra, dense punctata, femoribus rufis.

Loc.

23. L. femorata.

La Lepture noire à corcelet rougeâtre.

L. atra, thorace testaceo, femoribus
crassis.

Loc. Habitat flores.

* 24. L. turcica.

La Lepture aux croissans d'argent.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

L. nigra, elytris antice rufis, postice
lineis quatuor albis arcuatis.

Loc. Habitat horros.

25. *L. crassipes.*

La Lepture noire à grosses cuisses brunes.

L. atra, femoribus crassius rufis.

Loc. Habitat flores.

26. *L. fusca.*

La Lepture brune.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

L. tota fusca punctata.

Loc. Idem.

27. *L. sanguinea.*

La Lepture veloutée couleur de feu.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

L. nigra, thorace coleoptrisque sericeo-rubris.

Loc. Habitat truncos arborum & frequentissime loca domorum ubi lignum servatur.

28. *L. attenuata.*

La Lepture à étuis étranglés.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

L. nigra, elytris pedibusque rubescentibus lividis, coleoptris attenuatis.

Loc. Habitat flores.

XXV. STENOCORUS. *LE STENCORE.*

Antennæ à basi ad apicem decrescentes, ante oculos positæ.

Elytra apice angustiora.

FAMIL. I. *Thorax armatus spinâ vel tuberculo laterali.*

1. S. parifinus.

Le Stencore lisse à bandes jaunes.

Long. 8, 9 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

S. glaber, è fusco niger, elytro singulo lineis tribus elevatis, maculis duabus luteis, thorace spinoso.

Loc. Habitat sylvas.

2. S. inquisitor.

Le Stencore noir velouté de jaune.

Long. 6 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

S. niger, vellere flavo variegatus, ely-

tris lineis duabus elevatis , thorace spinoso.

Loc. Habitat flores.

3. *S. geniculatus.*

Le Stencore à genoux noirs.

Long. 7 , 8 , 10 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2 , 2 $\frac{1}{3}$ lig.

S. à fusco niger , femoribus rufis articulis nigris.

Loc. Idem.

4. *S. rubro-violaceus.*

Le Stencore rouge à étuis violets.

Long. 9 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

S. ruber , oculis nigris , elytris violaceis.

Loc. Habitat arbores.

5. *S. rubeus.*

Le Stencore jaune à bandes noires.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger , elytris testaceo-flavis , punctis duobus , cruce fascisque nigris.

Loc. Habitat rubum.

FAMILIA II. *Thorax inermis.*

6. *S. lamed.*

Le Stencore bedeau.

S. niger, elytris rubescentibus, apice futuraeque medietate nigris.

Loc.

7. S. melanurus.

Le Stencore noir à écus rougeâtres.

S. niger, elytris rubescentibus lividis, apice nigris. *Mas.*

S. niger, elytris rubescentibus lividis, apice simili. *Fœmina.*

Loc. Habitat sepes & arbores.

8. S. lutescens.

Le Stencore noir à écus jaunes.

S. niger, elytris luteis, apice nigris.

Loc. Habitat rubum.

9. S. piceus.

Le Stencore noir à ventre rougeâtre,

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

S. niger nitidus, abdomine fusco-rubente.

Loc. Idem.

10. S. clavipes.

Le Stencore noir à cuisses rouges,

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger, femoribus clavatis rufis, apice nigris.

Varietas A. S. totus niger.

Long. $3 \frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

Loc.

11. *S. sylvestris.*

Le Stencore noir à corcelet rouge.

Long. 4 lig. Larg. $1 \frac{1}{4}$ lig.

S. niger, thorace rubro.

Loc. Habitat urbem Fontainebleau.

12. *S. aquaticus.*

Le Stencore doré.

Long. $2 \frac{1}{2}$, 3, 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$, 1 lig.

S. deauratus, femoribus posticis dentatis.

Varietas A. Stenocorus rubro-æneus,
femoribus posticis dentatis.

B. *Stenocorus viridi-æneus*,
femoribus posticis dentatis.

C. *Stenocorus flavo-æneus*, fe-
moribus posticis dentatis.

D. *Stenocorus violaceo-æneus*,
femoribus posticis dentatis.

E. *Stenocorus nigro-æneus*, fe-
moribus posticis dentatis.

Loc. Habitat rivulorum ripas, & irides pratorum.

* 13. S. ruber.

Le Stencore rouge.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

S. totus ruber, oculis nigris.

Loc.

* 14. S. ignitus.

Le Stencore noir à étuis rouges.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

S. niger, elytris, ruberrimis dense punctatis.

Loc.

* 15. S. funereus.

Le Stencore en deuil.

Long. 9 lig. Larg. 3 lig.

S. totus niger punctatus.

Loc.

XXVI. LUPERUS. *LE LUPERE.*

Antennæ filiformes articulis longis.

Thorax planus, marginatus.

1. L. ulmarius.

Le Lupere noir à corcelet & pattes rouges.

L. niger, thorace pedibusque rufis.
Loc. Habitat ulmum.

2. *L. betulinus*.

Le Lufere noir à pattes rouges.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

L. niger, pedibus rufis.

Loc. Habitat betulam.

XXVII. CRYPTOCEPHALUS. *LE*
GRIBOURI.

Antennæ filiformes articulis longis.
 Thorax gibbus hemisphæricus.

1. *C. alni*.

Le Gribouri bleu de l'aulne.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

C. violaceus, punctis inordinatis.

Loc. Habitat alnum.

2. *C. vitis*.

Le Gribouri de la vigne.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. niger, elytris rubris.

Loc. Habitat vitis folia.

3. *C. sericeus.**Le Velours vert.*

Long. 3, 4 lig. Larg. 2 lig.

*C. viridi-auratus sericeus.**Loc. Habitat salicem.*4. *C. bolati.**Le Gribouri à deux bandes jaunes.*Long. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.*C. niger*, elytro singulo duplici linea longitudinali flava.*Loc. Habitat prata & sepes.*5. *C. 4-maculatus.**Le Gribouri à deux taches jaunes.**C. niger*, capite thoraceque antice luteis, elytro singulo externe maculâ duplici flavâ.*Loc. Idem.*6. *C. bi-punctatus.**Le Gribouri rouge strié à points noirs.*Long. 2 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. niger, elytris rubris striatis, maculis quatuor limboque nigris.

Loc. Habitat circum.

7. C. cirsi.

Le Gribouri rouge sans stries, à points noirs.

C. niger, thorace lineis flavis, elytris rubris punctatis, maculis quatuor limboque nigris.

Loc. Idem.

8. violaceus.

Le Gribouri bleu strié.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. cœruleo-violaceus, punctis per strias digestis.

Loc.

9. S. cœruleus.

Le Gribouri bleu à points.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. cœruleus, punctis sparsis, tibiis anticis ferrugineis.

Loc.

10. C. niger.

Le Gribouri noir strié.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. niger striatus, pedibus rufis.

Loc.

11. C. rufipes.

Le Gribouri noir à corcelet rouge.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. niger striatus, thorace pedibusque rufis.

Loc.

12. C. fulvus.

Le Gribouri fauve.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. capite thoraceque fulvo, elytris pallidis.

Loc.

* 13. C. 10-maculatus.

Le Gribouri rouge à 10 taches noires.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. niger, elytris rubris punctatis maculis decem nigris.

Loc.

* 14. *C. limbosus.*

Le Gribouri rouge à corcelet jaune.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. thorace flavo maculis nigris; elytris rubris punctatis, maculis sex limboque nigris.

Loc

* 15. *C. chermesinus.*

Le Gribouri couleur de feu.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. niger thorace elytrisque rubris punctatis.

Loc.

* 16. *C. fuscipes.*

Le Gribouri à pattes brunes.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. cœruleus, punctis inordinatis, pedibusque villosis-fuscis.

Loc.

XXVIII. CRIOCERIS. *LE CRIOCERE.*

*Antennæ cylindraceæ articulis globosis.
Thorax cylindræus.*

1. *C. merdigera.**Le Criocere rouge du lys.*Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.*C. rubra.**Loc. Habitat lilia.*2. *C. 12-punctata.**Le Criocere rouge à points noirs.*Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.*C. rubra, punctis tredecim nigris.**Loc. Habitat asparagum.*3. *C. asparagi.**Le Criocere porte-croix de l'asperge.*Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 lig.*C. thorace rubro punctis duobus nigris, coleoptris flavis, cruce cœruleo-nigra.**Loc. Idem.*4. *C. hordei.**Le Criocere bleu à corcelet rouge.*Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*C. cœruleo-viridis thorace femoribusque rufis.**Loc. Habitat hordeum & avenam.*

5. *C. cyanella.**Le Criocere tout bleu.*Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.*C. tota cœruleo viridis.**Loc.*6. *C. pallida.**Le Criocere aux yeux noirs.*Long. 2 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. 1 lig.*C. pallida, oculis nigris.**Loc.** 7. *C. spinosissima.**La Châtaigne noire.*Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*C. tota atra, spinis horrida.**Loc* Habitat gramen loliaceum.* 8. *C. thoracica.**Le Criocere noir à corcelet rouge.*Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.*C. atro-cœrulea, thorace femoribusque fuscis, elytris punctis sparsis.**Loc.** 9. *C. atrata.**Le Criocere noir strié.*Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C.

C. tota atro-cœrulea striata.

Loc.

* 10. C. paleata.

Le Criocere paillet.

Long. $2 \frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

C. nigra, elytris pedibusque pallidis.

Loc.

XXIX. ALTICA. L'ALTISE.

Antennæ ubique æquales.

Femora postica crassa subglobosa.

1. A. helxines.

L'Altise bleue.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

A. viridi-cœrulea.

Loc. Habitat hortos.

2. C. malvæ.

L'Altise de la mauve.

A. nigra, elytris cœruleis, thorace pedibusque rubris.

Loc. Habitat folia malvæ.

3. A. bicolor.

L'Altise bedaude.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

E

A. nigra, elytris nigro-æneis striatis, thorace rubro, pedibus nigris.

Loc. Habitat malvam.

4. A. hortensis.

L'Altise noire dorée.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. nigro-ænea, elytris striatis, pedibus ferrugineis.

Loc. Habitat hortos frequentissima.

5. A. ovata.

L'Altise noire ovale.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.


A. nigro-ænea, ovata, pedibus nigris.

Loc. Habitat hortos.

6. A. brassicæ.

L'Altise noire allongée des crucifères.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

 A. nigro-ænea, oblonga, pedibus nigris.

Loc. Habitat cruciferas.

7. A. lævis.

L'Altise noire à pattes fauves.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{5}{8}$ lig.

A. nigra, ovata, pedibus rufis, elytris non striatis.

Loc. Habitat hortos.

8. A. minuta.

L'Altise noire à jambes jaunes.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. nigra, subrotunda, tibiis ferrugineis.

Loc. Idem.

9. A. nemorum.

L'Altise à bandes jaunes.

Long. $\frac{1}{2}$, 1 lig. Larg. $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ lig.

A. atra, elytris longitudinaliter in medio flavescentibus.

Loc. Habitat aromaticas plantas.

10. A. marginata.

L'Altise à bordure noire.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. nigra; thorace elytrisque flavis, oris nigris.

Loc. Habitat hortos.

11. A. hyosciami.

L'Altise du choux.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

E ij

A. cœrulea, elytris striatis, tibiis ferrugineis.

Loc. Habitat brassicam & hyosciamum.

12. A. cœrulea.

L'Altise bleue sans stries.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

A. cœrulea, elytris punctis sparsis, tibiis ferrugineis.

Loc. Habitat brassicam.

13. A. nitidula.

L'Altise rubis.

Larg. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. nigro-aurata, thorace aureo, femoribus ferrugineis.

Loc. Habitat salicem.

14. A. aurea.

Le Plutus.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. aurea, pedibus flavis.

Loc. Habitat hortos.

15. A. 4-punctata.

L'Altise à points rouges.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

A. nigra , coleoptris punctis quatuor
rubris.

Loc. Idem.

16. A. ferruginea.

L'Altise fauve à stries.

A. oblonga , ferruginea , elytris striatis.

Loc. Idem.

17. A. fulva.

L'Altise fauve sans stries.

Long. 1 lig. Larg. 1 lig.

A. ovata ferruginea, elytris punctis sparsis.

Loc. Idem.

18. A. exfoleta.

L'Altise jaune.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

A. flava.

Loc. Idem.

29. A. pallida.

La Paillette.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. elytris pallido-flavis , capite nigro.

Loc. Idem.

* 20. *A. ænea*.

L'Altise bronzée.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

A. nigro-ænea, ovata, pedibus rufis, elytris punctis sparsis.

Loc. Habitat hortos.

XXX. GALERUCA. *LA GALERUQUE.*

Antennæ ubique æquales, articulis subglobosis.

Thorax inæqualis, scaber, marginatus.

1. *G. tanaceti*.

La Galerique Brunette.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

G. atro-fusca, elytris lineis tribus elevatis, punctis numerosis.

Varietas A. fusca, elytris lineis elevatis interruptis.

Loc. Habitat tanacetum, & flores compositos in pratis.

2. *G. sanguinea*.

La Galerique Sanguine.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

G. sanguineo-rubra.

Loc. Habitat flores.

3. G. ulmi.

La Galerique à bandes de l'orme.

Long. 2, 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig.

G. pallida, thorace nigro variegato, elytris fasciis duabus longitudinalibus nigris.

Loc. Habitat folia ulmi, abundans.

4. G. aquatica.

La Galerique aquatique.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

G. pallida, thorace nigro variegato, elytris unicoloribus pallidis.

Loc. Habitat potamogeton in rivis & stagnis.

5. G. livida.

La Galerique grisette.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

G. nigra, thorace elytrisque luteo-lividis.

Loc. Habitat betulam.

6. G. violacea.

La Galerique violette.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

E iv

G. nigro-violacea.

Loc.

* 7. G. viridis.

La Galerique verte.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

G. thorace pallide flavescente, elytris viridibus nitentibus.

Loc.

8. G. 4-maculata.

La Galerique quadrille.

Long. $2 \frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

G. rubro-lutea, maculis quatuor nigris.

Loc.

XXXI. CHRYSOMELA. LA CHRY- SOMELE.

Antennæ à basi ad apicem crescentes,
articulis globosis.

Thorax æqualis marginatus.

1. C. populi.

*La grande Chrysomele rouge à
corcelet bleu.*

Long. 5, 6 lig. Larg. 4 lig.

C. nigro-cœrulea, elytris rubris apice nigris.

Variet. A. ead. elytris omnino rubris.

La petite Chrysomèle rouge à corcelet bleu.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

Loc. Habitat populum.

2. C. polita.

La Chrysomèle rouge à corcelet doré.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 $\frac{1}{3}$ lig.

C. viridi-ænea, elytris rubicundis, punctis sparsis.

Loc.

3. C. striata.

La Chrysomèle rouge à corcelet noir.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C. nigra, elytris rubris striatis, striis punctatis.

Loc.

4. C. 10-punctata.

La Chrysomèle rouge à points noirs.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

C. rubra , elytro singulo maculis quinque nigris.

Loc. Habitat salicem.

5. C. hæmoptera.

La Chrysomele violette.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 lig.

C. tota violacea.

Loc.

6. C. violaceo-cœrulea.

La Chrysomele bleue à corcelet violet.

Long. 4 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. cœrulea, thorace violaceo.

Variet. ead. thorace nigro-violaceo.

Loc.

7. C. nigra.

La Chrysomele noire à aîles rouges.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

C. tota nigra.

Loc.

8. C. sanguinolenta.

La Chrysomele noire à bordure rouge.

Long. 5 lig. Larg. 4 lig.

C. nigro-cœrulea, elytris atris punctatis, margine exterioro rubro.

Loc. Habitat sylvas.

9. C. marginata.

La Chrysomele bleue à bordure rouge.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 lig.

C. nigro-cœrulea, elytris lucidis, punctatis margine exterioro & anteriore rubris.

Loc. Habitat prata; rara.

10. C. graminis.

Le grand Vertubleu.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

C. viridi-cœrulea.

Loc. Habitat galeopsum, lamium, mentham & gramina.

11. D. viridula.

La Chrysomele dorée.

Long. 2, 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig.

C. viridis nitida, thorace antice æquali, elytris pone contiguïs.

Loc. Habitat flores labiatis.

12. *C. ænea.**Le petit Vertubleu.*Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.*C. viridis nitida*, thorace antice excavato, fasciis elytrorum longitudinalibus cœruleis.*Loc.* Habitat flores labiaros.13. *C. nitidula.**La Chrysomele à gallons.*

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

C. viridis nitida, striis decem cupreis, punctorum duplici serie divisis.*Loc.* Idem.14. *B. fasciata.**L'Arlequin doré.*Long. 3 , 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 , 2 $\frac{1}{4}$ lig.*C. aurea* , fasciis cœruleis , cupreisque alternis , punctis inordinatis.*Loc.* Habitat colles aridos.15. *C. rubro-cuprea.**La Chrysomele briquetée.*Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 lig.

C. supra rubro-cupræa, infra nigra nitens.

Loc.

16. C. malvæ.

La Chrysomele verte à corcelet rouge.

Long. $1 \frac{1}{4}$, $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. nigra, elytris cœruleo-viridibus, thorace pedibus antennarumque basifus.

Loc. Habitat malvam.

17. C. betulæ.

La Chrysomele bleue du saule.

Long. $1 \frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. 1, $1 \frac{1}{3}$ lig.

C. nigro-purpurea; punctis excavatis, striata.

Loc. Habitat falicem & betulam.

18. C. thoracica.

La Chrysomele à suture noire.

Long. $1 \frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

C. rubra, thorace punctis duobus nigris, coleoptrorum futurâ nigrâ.

Loc.

19. *C. caraboides.*

La Chrysomele à un seul étui.

Long. 3, 6, 7 lig.

C. atro - purpurea, elytris coadunatis,
alis nullis.

Loc. Habitat hortos & sylvas; larva Gallium.

20. *C. phellandrii.*

La Chrysomele à bandes jaunes.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

C. oblonga nigra, elytrorum lineis duabus longitudinalibus luteis.

Loc. Habitat phellandrium.

21. *C. ferruginea.*

La Chrysomele brunie.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. nigro cuprea, punctis elytrorum per strias digestis.

Loc.

22. *C. gemellata.*

La Chrysomele à stries jumelles.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. viridis, punctis elytrorum per strias gemellas digestis.

Loc.

* 23. *C. scabra.*

La Chrysomele gresillée.

Long. 1. $\frac{3}{5}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. viridi-aurea, elytris scabris nitentibus.

Loc.

24. *C. antiqua.*

La Chrysomele antique.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. tota fulvo-cuprea punctata.

Loc.

25. *C. futurata.*

La Chrysomele couturée.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

C. rubescens, elytrorum striis punctatis,
futura nigra.

Loc.

26. *C. tulipa.*

La Chrysomele tulipe.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. thorace pedibusque fulvis; elytris an-
tice luteis maculâ fuscâ; postice fus-
cis, maculis luteis.

Loc.

XXXII. MYLABRIS. *LE MYLABRE.*

Antennæ sensim crescentes, articulis
hemi-phæricis, rostro brevi plano
insidentes.

Antennæ quatuor in extremo rostri.

1. *M. crucigera.*

Le Mylabre à croix blanche.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

M. fusca, cinereo - nebulosa abdominis
apice cruce albâ.

Loc. Larva legumina habitat, mylabris flores,

2. *M. fusca.*

Le Mylabre brun.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

M. tota fusca.

Loc.

3. *M. sericea.*

Le Mylabre satiné.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. nigra, abdomine albo sericeo.

Loc. Habitat flores.

XXXIII. RHINOMACER. *LE BEC-*
MARE.

Antennæ clavatæ integræ, rostro longo
infidentes.

1. R. elongatus.

Le Becmare levrette.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

R. corpore angusto longo niger, thorace
fasciis quatuor albicantibus.

Loc. Habitat carduum.

2. R. viridis.

Le Becmare vert.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

R. totus viridi-sericeus.

Loc.

3. R. auratus.

Le Becmare doré.

Long. 2 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

R. viridi-auratus, subtus nigro-violaceus.

Loc.

4. R. ruber.

Le Becmare doré à étuis rouges.

Long. $1 \frac{1}{4}$, 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ 1 lig.

R. niger, elytris rubris, capite thoraceque aureis, proboscide longitudine fere corporis.

Loc.

5. R. cœruleus.

Le Becmare bleu à poil.

Long 1, 1 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$, 1, 1 $\frac{1}{4}$ lig.

R. subvillosus cœruleus.

Loc. Habitat flores.

6. R. niger.

Le Becmare non strie.

R. nigro-fuscus, glaber, punctato striatus.

Loc. Idem.

7. R. oblongus.

Le Becmare allongé.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

R. nigro-viridescens, oblongus striatus.

Loc. Habitat umbelliferarum flores.

8. R. fulvipes.

Le Becmare noir à pattes fauves.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

R. subglobosus, niger, striatus, femoribus rufis.

Loc. Habitat flores.

9. R. minutus.

Le Becmare puce.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

R. subglobosus, villosus, niger, pedibus elytrisque rufis.

Loc. Idem.

10. R. coccineus.

Le Becmare laque.

Lon. $1 \frac{1}{2}$, 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$, $1 \frac{1}{4}$ lig.

R. niger, thorace elytrisque rubris, proboscide longitudine capitis.

Loc.

11. R. coryli.

La Tête écorchée.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

R. niger, thorace elytrisque rubris, capite pone elongato.

Loc. Habitat cotylum.

* 12. R. striatus.

Le Becmare noir à trompe fauve.

Long. $1 \frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

R. oblongus, nigro cupreus; pedibus & proboscide fulvis, punctis elytrorum per strias digestis.

Loc.

* 13. R. fulgidus.

Le Becmare rouge.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

R. ovatus, striatim punctatus, supra ruber, infra cupreus; antennis, proboscide pedibusque nigris.

Loc.

XXXIV. CURCULIO. *LE CHARANSON.*

Antennæ clavatæ fractæ, rostro longo corneo infidentes.

FAMIL. I. *Femoribus inermibus.*

1. C. nebulosus.

Le Charanson à trompe sillonnée.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

C. albo nigroque varius, proboscide planiusculâ carinatâ, thoracis longitudine.

Loc. Habitat arbores.

2. *C. rugosus.**Le Charanson ridé.*

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

*C. totus fuscus rugosus.**Loc. Habitat prata.*3. *C. fulcatus.**Le Charanson à corcelet sillonné.*Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.*C. fusco-nebulosus, thorace fulcato;
elytris striatis.**Loc. Idem.*4. *C. paraplecticus.**Le Charanson à suture noire.*Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.*C. oblongus, elytris villosa-cinereis,
sutura nigrâ.**Loc.*5. *C. pictus.**Le Charanson à côtes tachetées.*Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.*C. fuscus, fulvo maculatus; elytris striatis,
striis alternatim nigro maculatis.**Loc. Habitat loca arida.*

6. *C. bipunctatus.*

Le Charançon à deux points blancs.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, fuscus thoracis lateribus albidis, elytris striatis puncto albo.

Loc.

7. *C. fasciatus.*

Le Charançon à deux bandes transverses.

Long. 9 lig. Larg. 4 lig.

C. nigro-fuscus, thorace utrinque fasciâ longitudinali, elytris duplici transversâ cinereâ.

Loc. Habitat carduum.

8. *C. cardui.*

Le Charançon tacheté des têtes de chardon.

Long. 2 $\frac{1}{2}$, 4 lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$, 2 lig.

C. niger, striatus, maculis villosis fuscis nebulosus.

Loc. Idem.

9. *C. elegans.*

Le Charançon brodé.

Long. 3 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. niger, thorace punctato, elytris alternatim striatis & punctatis.

Loc.

10. C. incanus.

Le Charanson gris, strié & sans aîles.

Long. 2 $\frac{1}{2}$, 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{1}{4}$ lig.

C. cinereus, squamosus, alis carens, elytris striatis.

Loc. Habitat hortos, flores, arbores; abundans.

11. C. incisus.

Le Charanson noir à sillons.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{5}$ lig.

C. oblongus, totus niger, thorace punctato, elytris fulcatis.

Loc.

12. C. argentatus.

Le Charanson à écailles vertes, & pattes fauves.

Long. 2, 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$, 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. squamoso-viridis, rostro thorace brevior, pedibus rufis.

Loc. Habitat hortos, arbores, &c.

13. *C. fasciolatus.**Le Charançon à corcelet rayé.*Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.*C.* rostro thoracis longitudine, thorace tribus striis pallidioribus.*Loc.* Habitat arbores sepium.14. *C. interfectus.**Le Charançon écailleux à bandes.*Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*C.* rostro thorace brevior, squamis nientibus, thoracis elytrorumque fasciis longitudinalibus.*Loc.* Habitat flores.15. *C. modestus.**Le Charançon grisette.*Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{5}$ lig.*C.* rufus, subvillosus, capite nigricante, rostro thorace brevior.*Loc.* Idem.16. *C. viridis.**Le Charançon satin-vert.*Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.*C.*

C. cœruleo-viridis nitens, thorace punctato, elytris striatis.

Loc. Habitat cruciferas.

17. C. funereus.

La Pleureuse.

Long.

C. oblongus, niger; abdomine squamoso, lateribus albis.

Loc.

18. C. granarius.

Le Charançon brun du bled.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. rufo-testaceus oblongus, thorace elytrorum fere longitudine.

Loc. Habitat grana; horreis infestus.

19. C. saltator.

Le Charançon sauteur brun.

C. rufus, femoribus posticis crassioribus, elytris rufis.

Loc. Habitat ulmum.

20. *C. alni*.

Le Charanson sauteur à taches noires.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. rufus, femoribus posticis crassioribus, elytris maculis quatuor nigris.

Loc. Habitat ulmum & alnum.

21. *C. quadrilis*.

Le Charanson quadrille à courte trompe.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. cinereus elytrorum puncto quadruplici nigricante, proboscide thorace brevior.

Loc.

22. *C. 5-maculatus*.

Le Charanson quadrille à longue trompe.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. cinereus, elytrorum puncto quadruplici albo, proboscide thorace longior.

Loc.

23. C. communis.

*Le Charançon satin gris.*Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. niger, ovatus, striatus, totus villosus-cinereus, thorace inermi.

Loc.

24. C. armatus.

Le Charançon à corcelet épineux.

Long.

C. ovatus, nigro-cinereus, thorace utrinque denticulato.

Loc.

25. C. pultiaris.

Le Charançon à bandes blanches.

Long.

Larg.

C. subrotundus, niger, squamosus, elytris striatis; thorace utrinque occuleato, lateribus lineâque mediâ albis.

Loc.

26. C. floriger.

*Le Charançon noir strié.*Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

F ij

124 ENTOMOLOGIA

C. subglobosus, cinereo-ater, striatus,
proboscide thoracis longitudine.

Loc. Habitat flores.

27. C. cinctus.

*Le Charanson roux à bande trans-
versale blanche.*

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. globosus rufus, elytris striatis, fasciâ
transversâ albâ.

Loc.

28. C. vittatus.

*Le Charanson noir à bande trans-
versale blanche.*

C. globosus niger, elytris striatis, fasciâ
transversâ albâ.

Loc. Habitat salicem.

29. C. murinus.

Le Charanson souris.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. subvillosus-murinus, scutello albicante.

Loc.

30. *C. spinifer.**Le Charanson à côtes épineuses.*Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*C. totus fuscus spinosus, elytris striis elevatis villoso-spinosis.**Loc.*31. *C. denticulatus.**Le Charanson noir à côtes.*Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.*C. niger, scutello albicante, elytrorum striis utrinque denticulatis.**Loc.*32. *C. acridulus.**Le Charanson pyriforme.*Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.*C. pyriformis, nigro-cœrulescens, abdomine ovato.**Loc. Habitat flores.*33. *C. marmoratus.**Le Charanson marbré à bandes.*Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.*C. lividus, coleoptris fasciis plurimis obscuris.**Loc. Habitat flores salicariæ.*

FAMIL. II. *Femoribus denticulatis.*34. *C. coronatus.**Le Charançon à corcelet couronné.*Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.*C. niger apterus*, thorace utrinque puncto duplici fulvo, basi pilis fulvis coronatâ.*Loc.** 35. *C. scabrosus.**Le Charançon noir chagriné.*

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

C. totus niger, nitidus, elytris striatis subrugosis.*Loc.*36. *C. tigrinus.**Le Charançon tigré.*

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

C. niger, maculis villoso-flavis, elytris subrugosis.*Lcc. Habitat Normanniam.** 37. *C. contractus.**Le Charançon levrier.*Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus, totus niger, thorace punctato, elytris striato-punctatis.

Loc.

38. C. monopterus.

Le Charanson gris à étuis réunis & chagrinés.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. cinereus, squamosus, alis carens, elytris rugosis.

Loc.

* 39. C. fuscipes.

Le Charanson noir à pattes brunes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. niger striatus, pedibus fuscis.

Loc.

40. C. rugosissimus.

Le Charanson cartisanne.

Long. 3, 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. fuscus, apterus, elytris rugoso-striatis.

Loc.

41. C. auratus.

Le Charanson à écailles vertes.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

F iv

C. squamosus, viridi-auratus.

Loc. Habitat hortos, arbores.

42. C. querneus.

Le Charanson à étuis fauves.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus, niger, elytris pedibusque testaceis.

Loc. Habitat arbores.

43. C. geographicus.

Le Charanson géographique.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. subglobosus, nigro-fuscus, squamosus, lineolis albis variegatus.

Loc. Habitat viperinam.

44. C. stellifer.

Le Charanson brun à bandes transverses de taches blanches.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. fuscus, elytris striatis macularum albarum fasciâ triplici transversâ.

Loc.

45. *C. nucum.**Le Charançon trompette.*Long. 2, 3, 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{2}{3}$ lig.*C. rufo-marmoratus*, scutello cordato albo, proboscide subulatâ longissimâ.*Loc.* Habitat nuces.46. *C. tessellatus.**Le Charançon damier.*

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. flavesceus, elytris luteo & rufo tessellatis.*Loc.*47. *C. scrophularis.**Le Charançon à lozange de la scrophulaire.*Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.*C. subglobosus niger*, punctis duobus ante futurâ longitudinales coleopterorum, thorace exalbido.*Loc.* Habitat scrophulariam.48. *C. hortulanus.**Le Charançon gris de la scrophulaire.*Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

F v

C. subglobosus, cinereus, punctis duobus nigris futuræ longitudinalis coleoptorum.

Loc. Habitat scropulariam.

49. C. pericarpus.

Le Charanson porte-cœur de la scrophulaire.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. subglobosus; fusco-nebulosus, maculâ cordatâ albâ in medio dorso.

Loc. Idem.

50. C. tripunctatus.

Le Charanson brun à points blancs.

C. subglobosus, squamosus, cinereo-fuscus elytrorum maculis tribus & apice albis.

Loc. Habitat prata.

51. C. armiger.

Le Charanson noir à corcelet armé.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. niger, thorace utrinque dentato.

Loc.

52. *C. plebeius.*

Le Charançon noir à corcelet sans points.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. fusco-niger thorace inermi.

Loc.

53. *C. scutellatus.*

Le Charançon brun à écusson blanc.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. fuscus, scutello puncto albo, elytris maculâ rubescente.

Loc.

54. *C. rubiginus.*

Le Charançon couleur de rouille.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. ferrugineus, elytris striatis, oculis nigris.

Loc.

55. *C. villosus.*

Le Charançon velouté.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

F vj

C. obscure rufus, villis cinereis aspersus, rostro, thorace brevior.

Loc.

56. *C. virgo*.

Le Charanson vierge.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, villis cinereis aspersus, rostro thoraci æquali.

Loc. Habitat flores.

* 57. *C. punctulatus*.

Le Charanson noir picoté.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. totus niger, oblongus, thorace punctato, elytris punctato-striatis, femoribus denticulatis.

Loc.

* 58. *C. cordifer*.

Le Charanson à cœur.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. cinereus, scutello albo, fasciâque elytrorum interruptâ albâ, proboscide longissimâ.

Loc.

59. *C. fasciatus.*

Le Charanson fascié.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. fusco-cinereus villosus elytrorum suturâ maculisque albis.

Loc.

XXXV. BOSTRICHUS. *LE BOSTRICHÉ.*

Antennæ clavatæ, clavâ ex articulis tribus compositâ, capiti insidentes.

Rostrum nullum.

Thorax cubicus caput intra se recondens.

Tarsi nudi spinosi.

1. *B. ruber.*

Le Bostriche.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

B. niger, elytris rubris.

Loc. Habitat sylvas.

* 2. *B. fuscus.*

Le Bostriche brun.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

B. fuscus, thorace costis, elytris striis punctatis elevatis.

Loc.

XXXVI. CLERUS. *LE CLAIRON.*

Antennæ clavatæ, clavâ ex articulis tribus compositâ, capiti insidentes.

Rostrum nullum.

Thorax subcylindræus, non marginatus.

Tarsi spongiosi.

1. C. apiarius.

Le Clairon à bandes rouges.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

C. nigro-violaceus, hirsutus, elytris fasciâ triplici coccineâ.

Loc. Larva nidos apium habitat, clerus flores.

2. C. violaceus.

Le Clairon bleu.

Long. 1 $\frac{1}{2}$, 2, 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$, 1, 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C. nigro-cæruleus.

Loc. Larva & clerus putrida loca habitat, frequens in domis.

3. *C. cruciger.**Le Clairon porte-croix.*

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. fuscus, villosus, elytris flavis cruce fuscâ.

Loc. Habitat flores.

4. *C. villosus.**Le Clairon satiné.*Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*C. niger*, subovatus, villis cinereis.

Loc. Habitat flores resedæ.

* 5. *C. fasciatus.**Le Clairon porte-livrée.*Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.*C. niger villosus*, elytrorum fasciâ anticâ rufâ, posticâ albâ.*Varietas A. Id. thorace rufo.*Long. 3 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 lig.*B. Id. niger subvillosus*, elytrorum fasciâ anticâ rufâ, mediâ flavâ, posticâ albâ.Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

Loc. Habitat arbores verustas.

* 6. *C. maculatus.**Le Clairon à taches jaunes.*

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

*C. fusco-niger subvillosus, elytro singulo maculis duabus flavis.**Loc.*XXXVII. ANTRIBUS. *L'ANTRIBE.*

Antennæ clavatæ, clavâ ex articulis tribus compositâ capiti insidentes.

Rostrum nullum.

Thorax latus, marginatus.

Tarsi spongiosi.

1. *A. marmoratus.**L'Antribe marbré.*Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{5}$ lig.*A. ovatus, niger, elytris striatis, rubro nigroque marmoratis.**Loc. Habitat jaceam pratensem.*2. *A. variegatus.**L'Antribe minime.*Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*A. ovatus subvillosus, è fusco cinereoque variegatus.**Loc. Habitat flores,*

3. *A. ater.**L'Antribe noir strié.*Long. 6, 7 lig. Larg. $2 \frac{1}{3}$ lig.*A. ater*, elytris apice cinerascētib;.

Loc. Habitat flores.

4. *A. pulicarius.**L'Antribe des fleurs.*Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.*A. niger*, elytris abdomine brevioribus.

Loc. Habitat umbelliferas plantas.

5. *A. bimaculatus.**L'Antribe à deux points rouges
au bout des écus.*Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.*A. niger ovatus*, elytris apice punctis
duobus rubris.

Loc. Habitat flores.

6. *A. lævis.**L'Antribe noir lisse.*Long. $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.*A. niger*, ovatus, elytris abdomen te-
gentibus.

Loc. Idem.

* 7. *A. fulvus.**L'Antribe fauve.*Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.*A. oblongus, totus rufus.**Loc. Habitat vetusta ligna.** 8. *A. connexus.**L'Antribe panaché.*Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.*A. oblongus niger subvillosus, elytris maculis connexis luteis.**Loc. Habitat flores.** 9. *A. nitidus.**L'Antribe perlé.*Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*A. ovatus totus fuscus.**Loc. Idem.** 10. *A. vittatus.**L'Antribe à bandes.*Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.*A. ovatus fuscus, futurâ longitudinali nigrâ.**Loc. Idem.*

11. *A. pallidus.**L'Antribe paillet.*Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.*A. ovatus*, subtus pallidus, supra fuscus
subvillosus.*Loc.* Habitat flores.12. *A. intersectus.**L'Antribe bigaré.*

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

A. oblongus ater, elytris signaturis al-
bis pedibusque annulis albis intersectis.*Loc.* Idem.XXXVIII. SCOLYTUS. *LE SCO-*
LYTE.

Antennæ clavatæ, clavâ solidâ.

Rostrum nullum.

1. *S. niger.**Le Scolyte.*Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*Loc.* Habitat cortices.

XXXIX. CASSIDA. *LA CASSIDE.*

Antennæ extrorsum crassiores , nodosæ.

Thorax & elytra marginata.

Caput thorace tectum.

1. *C. viridis.*

La Casside verte.

Long. 1 , 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$, 1 lig.

C. viridis , corpore nigro.

Loc. Habitat plantas verticillatas & carduos.

2. *C. nebulosa.*

La Casside brune.

Long. 2' , 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. nebulosa , pallida , corpore nigro.

Loc. Idem.

3. *C. nobilis.*

La Casside à bandes d'or.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. pallida , lineâ duplici longitudinali , viridi-deaurata.

Loc. Idem.

4. *C. thoracica.**La Casside verte à corcelet brun.*Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{2}{3}$ lig.*C. viridis*, thorace ferrugineo.*Loc.* Habitat asteris varias species.5. *C. variegata.**La Casside panachée.*Long. $3 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.*C. viridis* maculis nigris variegata.*Varietas A. Cassida rubra* maculis
nigris variegata.*Loc.* Habitat enulam campanam.XL. ANASPIS. *L'ANASPE.*

Antennæ filiformes sensim crescentes.

Scutellum vix apparens.

Thorax planus, lævis non marginatus.

1. *A. nigra.**L'Anaspe noire.*Long. 1, $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg $\frac{1}{2}$ lig.*A. tota nigra.**Loc.* Habitat flores.

2. *A. bicolor.**L'Anaspe à taches jaunes.**A. nigra*, elytro singulo antice maculâ flavâ.*Loc. Habitat flores.*3. *A. thoracica.**L'Anaspe à corcelet jaune.*Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{5}$ lig.*A. nigra*, thorace luteo.*Loc. Habitat rator.*4. *A. maculata.**L'Anaspe fauve.*Long. $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*A. villoso-flavescens*, coleoptrorum maculis tribus obscuris.*Loc. Idem.*

ORDO TERTIUS.

Caraç. Ordinis III.

Tarforum articuli tres.

XLI. COCCINELLA. *LA COCCINELLE.*

Antennæ extrorsum crassiores, nodosæ, antennulis breviores.

Corpus hæmisphæricum.

1. C. bi-punctata.

*La Coccinelle rouge à 2 points noirs.*Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. coleoptris rubris, punctis duobus nigris.

Loc. Habitat alnum; aphivora.

2. C. 5-punctata.

La Coccinelle rouge à 5 points noirs.

C. coleoptris rubis punctis quinque nigris.

Loc. Habitat hortos.

3. C. 7-punctata.

*La Coccinelle rouge à 7 points noirs.*Long. 3, 4 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$, 3 lig.

C. coleoptris rubris, punctis septem nigris.

Loc. Habitat tiliam.

4. C. 9-punctata.

La Coccinelle rouge à 9 points noirs & corcelet noir.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. coleoptris rubris, punctis novem nigris, thorace nigro, lateribus albis.

Loc. Habitat arbusta.

5. C. carpini.

La Coccinelle rouge à 9 points noirs & corcelet varié.

C. coleoptris rubris, punctis novem nigris, thorace nigro, antice albo.

Loc. Habitat carpinum.

6. C. 13-punctata.

La Coccinelle rouge à 13 points noirs & corcelet jaune varié.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C.

C. coleoptris rubris, punctis tredecim nigris.

Loc. Habitat arbuscula.

7. C. trinacris.

La Coccinelle rouge à 13 points noirs & corcelet rouge à bande.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. coleoptris rubris, punctis tredecim nigris, thorace rubro, medio nigro.

Loc. Habitat flores.

8. C. 11-punctata.

La Coccinelle rouge à 11 points & corcelet jaune.

Long. $1 \frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. 1, $1 \frac{1}{2}$ lig.

C. coleoptris rubris, punctis undecim nigris; thorace luteo nigro punctato.

Loc. Habitat ulmum.

9. C. argus.

La Coccinelle argus.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{3}$ lig.

C. rubra, punctis undecim nigris, thorace rubro immaculato.

Loc. Habitat sepes.

10. C. 19-punctata.

La Coccinelle rouge à 19 points noirs.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. coleoptris rubris, punctis novem decim nigris.

Loc. Habitat sepes.

11. C. 24-punctata.

La Coccinelle rayée.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. coleoptris rubris, punctis viginti-quatuor nigris, quibusdam connexis.

Loc. Habitat flores.

12. C. conglobata.

La Coccinelle à bordure.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. coleoptris rubris, punctis plurimis nigris, quibusdam connexis suturâ longitudinali nigrâ.

Loc. Habitat hortos.

12. C. 14-guttata.

La Coccinelle à 14 points blancs.

Long. 2, 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig.

C. coleoptris rubris, punctis quatuordecim albis.

Loc. Habitat hortos.

14. C. marginata.

La Coccinelle à points & bordure blanche.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. coleoptris rubris, punctis quatuordecim limboque albis.

Loc. Idem.

15. C. 14-punctata.

La Coccinelle à l'échiquier.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C. coleoptris flavis, punctis quadratis nigris, quibusdam connatis.

Loc. Idem.

16. C. 16-punctata.

La Coccinelle jaune à suture.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. coleoptris flavis, punctis sexdecim nigris, plurimis connexis, suturâ nigrâ.

Loc. Idem.

17. C. 22-punctata.

La Coccinelle jaune sans future.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. coleoptris flavis, punctis viginti nigris.

Loc. Habitat sepes.

18. C. 14-pustulata.

La Coccinelle noire à 14 points jaunes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. coleoptris nigris, punctis quatuordecim flavescentibus.

Loc. Habitat arbores.

19. C. 10-pustulata.

La Coccinelle noire à 10 points jaunes.

C. coleoptris nigris, punctis decem flavescentibus aut rubris.

Loc. Habitat hortos.

20. C. 6-pustulata.

La Coccinelle noire à points rouges.

Long. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. 1 lig.

C. ovata , coleoptris nigris , punctis sex rubris.

Varietas A. punctis quatuor rubris.

B. punctis duobus rubris.

C. punctis duobus luteis.

Loc. Habitat hortos.

21. C. fasciata.

La Coccinelle velue à bandes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. subvillosa nigra , fasciis duabus transversis rubris.

Loc. Habitat flores.

22. C. villosa.

La Coccinelle velue à points.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. subvillosa nigra , punctis quatuor luteo-rubris.

Loc. Idem.

23. C. interrupta.

La Coccinelle velue à bande interrompue.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

G iiij

C. subvillosa nigra, coleoptrorum basi fasciâ transversâ rubrâ interruptâ.

Loc. Habitat cortices & folia pruni; larva pilis albis & longis conspersa dicitur, *le Barbet blanc des écorces.*

24. C. pygmæa.

La Coccinelle velue à taches rouges au corcelet.

Long. $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. subvillosa nigra, thorace utrinque maculâ rubrâ.

Loc. Habitat flores.

25. C. 4-pustulata.

La Coccinelle tortue à 4 points rouges.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. rotunda nigra, coleoptrorum margine reflexo, punctis quatuor rubris.

Loc. Habitat urticam.

26. C. 2-pustulata.

La Coccinelle tortue à bande rouge.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

C. rotunda nigra, coleoptrorum margine reflexo, fasciâ transversâ rubrâ.

Loc. Habitat urticam.

* 27. C. testudinaris.

La Coccinelle noire à points rouges au corcelet.

C. rotunda nigra, coleoptrorum margine reflexo, thorace utrinque maculâ rubrâ.

Loc. Idem.

* 28. C. 16-guttata.

La Coccinelle à 16 points blancs.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. coleoptris rubris, punctis sexdecim albis.

Loc.

* 29. C. 12-guttata.

La Coccinelle à 12 points blancs.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

C. coleoptris rubris, punctis duodecim albis.

Loc.

XLII. TRITOMA. *LA TRITOME.*

Antennæ extrorsum sensim crassiores,
 antennulis longiores.
 Corpus oblongum.

1. T. bimaculata.

La Tritôme.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

Loc. Habitat corticis salices; rarissima.

ORDO QUARTUS.

Caract. Ordin. IV.

Tarforum primi & secundi pedum paris
 articuli quinque: pedum vero poste-
 riorum articuli quatuor.

XLIII. DIAPERIS. *LA DIA-
 PERE.*

Antennæ taxiformes, articulis lenti-
 formibus per centrum perfoliatis.
 Thorax convexus, marginatus.

1. D. fasciata.

La Diapere.

Long. 3 lig. Larg. 1, 1 $\frac{3}{4}$ lig.

Loc. Habitat ilicem, Fontis-Bellaquæi incola.

XLIV. PYROCHROA. *LA CARDINALE.*

Antennæ uno versu pectinatæ.

.. Thorax inæqualis, scaber, non marginatus.

1. P. ruberrima.

La Cardinale.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

Loc. Habitat sepes, autumnalis.

XLV. CANTHARIS. *LA CANTHARIDE.*

Antennæ filiformes.

Thorax inæqualis, scaber; non marginatus.

G v

FAMIL. I. *Tarforum articulis nudis.*1. *C. vesicatoria.**La Cantharide des boutiques.*Long. 4, 5, 8, 9 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2, 3 lig.*C. viridi-aurata antennis nigris.**Loc. Habitat fraxinos.*2. *C. attenuata.**La Cantharide à bande jaune.*Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.*C. nigra, elytris attenuatis, antice luteis.**Loc.*FAMIL. II. *Tarforum articulis spongiosis.*3. *C. crassipes.**La Cantharide verte à grosses cuisses.*Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*C. viridi-cœrulea, elytris attenuatis, femoribus posticis globosis.**Varietas A. viridi-cœrulea, elytris attenuatis.**Loc. Habitat prata.*

4. *C. fulva.*

La Cantharide fauve à grosses cuisses.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. nigra, elytris attenuatis fulvis, femoribus posticis globosis.

Loc. Habitat flores.

5. *C. villosa.*

La Cantharide jaune veloutée.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

[*C. flavescens*, subvillosa, elytris attenuatis.

Loc. Idem.

6. *C. flava.*

La Cantharide noire à étuis jaunes.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. subvillosa, nigra, elytris flavis, extremo antennarum articulo reliquis triplo majore.

Loc. Habitat fylvas.

7. *C. testacea.*

La Cantharide fauve avec la pointe des étuis noire.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

G vj

C. testacea, elytris apice nigris.
Loc.

8. C. formicoides.

La Cantharide fourmi.

Long. $1 \frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

C. fusca, elytris antice, thoraceque elongato rubris.

Loc.

9. C. variegata.

La Cantharide fourmi panachée:

Long. $1 \frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. nigra, elytris fulvis maculis quinque nigris connexis, thorace elongato.

Loc.

XLVI. TENEBRIO. *LE TÉNÉBRION.*

Antennæ filiformes.

Thorax planus marginatus.

FAMIL. I. *Antennæ articulis globosis, extrorsum crassiores.*

1. T. mortifaga.

Le Ténébrion lisse à prolongement.

Long. 10 lig. Larg. 4 lig.

T. atra, aptera, coleoptris lævibus, pone acuminatis.

Loc. Habitat plantas coacervatas & exesas in hortis.

2. T. rugosa.

Le Ténébrion ridé.

Long. 5 lig. Larg. 3 lig.

T. atra, aptera, coleoptris rugosis, pone acuminatis.

Loc. Habitat arenam.

3. T. gemellata.

Le Ténébrion à stries jumelles.

Long. 4 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, aptera, elytrorum striis octo punctatis per paria dispositis.

Loc. Habitat hortos.

4. T. striata.

Le Ténébrion à 8 stries lisses.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigro-fusca ovata, elytro singulo striis octo lævibus.

Loc. Habitat arva.

5. *T. cuprea.**Le Ténébrion bronzé.*Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.*T. nigro-cuprea*, elytro singulo striis octo, coleoptris pone acuminatis.

Loc. Idem.

6. *T. molitoria.**Le Ténébrion à 9 stries lisses.*Long. 7 lig. Larg. 2 $\frac{2}{3}$ lig.*T. atra*, oblonga, elytris striis novem lævibus.

Loc. Larva farinam habitat; tenebrio domos.

7. *T. fabulosa.**Le Ténébrion à stries dentelées.*

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

T. atra, elytris striis quinque utrinque dentatis.

Loc. Habitat putrida loca.

8. *T. nigra.**Le Ténébrion noir lisse.*Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, tota lævis, coleoptris pone rotundatis.

Loc. Habitat arenam.

9. T. villosa.

Le Ténébrion fauve velu.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. tota ferruginea subvillosa.

Loc.

10. T. ferruginea.

Le Ténébrion fauve lisse.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. tota ferruginea lævis.

Loc.

11. T. fulcata.

Le Ténébrion cannelé.

Long. 7 lig. Larg. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

T. atra, aptera rotundata, elytris fulcis tribus elevatis.

Loc. Habitat provincias Galliar meridionales.

FAMILIA II. *Antennæ articulis longis, ubique æquales.*

12. T. lutea.

Le Ténébrion jaune.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

T. lutea.

Loc. Habitat flores.

* 12. T. arenaria.

Le Ténébrion à étuis fauves.

Long. $6 \frac{1}{2}$, 6, $5 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

T. nigra, elytris striatis ferrugineis.

Loc.

* 13. T. rotundata.

Le Ténébrion arrondi.

Long. $3 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

T. nigra - cuprea, elytris singulis striis octo punctatis, coleoptris pone rotundatis.

Loc.

* 14. T. globulosa.

Le Ténébrion à corcelet arrondi.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

T. atra scabra, thorace globoso.

Loc.

* 15. T. cœrulea.

Le Ténébrion bleu.

Long. $4 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

T. cœrulea punctata, elytris striatis,
tarsis fulvis.

Loc.

XLVII. MORDELLA. LA MOR- DELLE.

Antennæ subserratae, articulis triangularibus.

Thorax antice attenuatus, convexus.

1. M. aculeata.

La Mordelle noire à pointe.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. atra, caudata, unicolor.

Loc. Habitat flores.

2. M. iriformis.

La Mordelle veloutée à pointe.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{4}$ lig.

M. atra, caudata, fasciis villosa-aureis.

Loc. Idem.

3. M. striata.

La Mordelle à étuis jaunes striés.

Long. 4 lig. Larg. $1 \frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, elytris fulvis striatis.

Loc. Habitat arbores in sylvis.

4. *T. fulva*.

*La Mordelle à étuis jaunes sans
stries.*

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

M. nigra, elytris fulvis lævibus.

Loc. Idem.

5. *M. flavipes*.

La Mordelle brune à pattes fauves.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{3}{4}$ lig.

M. fusca, pedibus ferrugineis.

Loc. Idem.

XLVIII. NOTOXUS. *LA CUCULLE*.

Antennæ filiformes.

Thorax cucullatus, dente acuto.

1. *C. cucullatus*.

La Cuculle.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

Loc. Habitat umbelliferas, rarissimus.

XLIX. CEROCOMA. LA CEROCOME.

Antennæ ultimo articulo clavato :
(masculis complicatæ , in medio
pectinataæ).

1. C. viridis.

La Cerocome.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

Loc.

ARTICULUS SECUNDUS.

Caract. articuli II.

Coleoptra dimidiata dura.

ORDO PRIMUS.

Caract. ordinis I.

Tarforum articuli quinque.

L. STAPHYLINUS. LE STAPHY-
LIN.

Antennæ filiformes.

Alæ testæ.

Abdomen inerme.

1. *S. maxillofus.**Le grand Staphylin noir lisse.*Long. 11 lig. Larg. 2 $\frac{3}{4}$ lig.*S. ater*, extremo antennarum articulo lunulato.*Loc.* Habitat sylvas, hortos, &c.2. *S. cœrulefcens.**Le Staphylin bleu.*Long. 7 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.*S. atro-cœrulefcens*, extremo antennarum articulo lunulato.*Loc.* Habitat hortos.3. *S. globulifer.**Le petit Staphylin noir.*Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.*S. ater*, extremo antennarum articulo subgloboso, elytris thorace brevioribus.*Loc.* Idem.4. *S. macroclytron.**Le Staphylin noir à longs etuis.*

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

S. ater, elytris thorace duplo longioribus.

Loc. Habitat hortos.

5. *S. nebulosus*.

Le Staphylin nébuleux.

Long. 8 lig. Larg. 2 lig.

S. niger, elytris abdomineque cinereo-nebulosis.

Loc. Habitat bovinas fæces.

6. *S. tessellatus*.

Le Staphylin velouté.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{5}{4}$ lig.

S. villosus, è fusco cinereoque viridi tessellatus.

Loc. Habitat hortos.

7. *S. hirtus*.

Le Staphylin bourdon.

Long. 10 lig. Larg. 3 lig.

S. niger villosus, capite thorace anoque pilis fulvo-aureis.

Loc. Habitat sylvas, rarus.

8. *S. chrysocephalus*.

Le Staphylin à tête jaune.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{4}{5}$ lig.

S. pubescens, capite flavo, thorace elytrisque fusco nigroque nebulosis, punctis impressis.

Loc. Habitat arva.

9. *S. erythropterus*.

Le Staphylin à étuis couleur de rouille.

Long. 6 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. ater, non nitens, elytris pedibusque rufis.

Loc.

10. *S. flavopterus*.

Le Staphylin noir à étuis fauves & lisses.

Long. 1, 3, 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ lig.

S. niger nitens, pedibus, elytrisque lævibus testaceis.

Varietas A. *Staphylinus niger nitens*, pedibus elytrisque lævibus testaceis, thoracis punctis per strias digestis.

Le Staphylin à étuis fauves & corcelet strié.

Loc.

11. *S. fulvopterus.*

Le Staphylin à étuis marons pointillés.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{5}$ lig.

S. niger, nitens, pedibus coleoptrisque testaceis, elytris punctatis.

Loc.

12. *S. brachypterus.*

Le Staphylin à étuis très-courts.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

S. niger, nitens, pedibus elytrisque fuscis punctatis, thorace plano marginato.

Loc.

13. *S. compressus.*

Le Staphylin applati à étuis bruns.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. niger, nitens, antennis, pedibus, elytris, anoque testaceis, thorace marginato.

Varietas A. Idem; antennis clavatis;

Loc. Habitat flores.

14. *S. punctatus.*

*Le Staphylin noir à pattes fauves
& étuis pointillés.*

Long. $3 \frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{5}$ lig.

S. niger, punctatus, antennis pedibusque ferrugineis.

Loc. Habitat flores.

15. *S. rufipes.*

*Le Staphylin noir à corcelet lisse
& bordé.*

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger, thorace marginato lævi, pedibus rufis.

Loc. Habitat arenam.

16. *S. fulcatus.*

*Le Staphylin noir à corcelet sillonné
& bordé.*

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger, thorace marginato suturato, pedibus rufis.

Loc. Idem.

17. *S. æneus.*

Le Staphylin à étuis bronzés.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

S.

S. niger, elytris nigro-æneis.

Loc.

18. *S. chrysomelinus*.

Le Staphylin couleur de paille.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

S. niger, thorace, elytris, pedibusque subtestaceis.

Loc. Habitat arenam,

19. *S. marginatus*.

Le Staphylin à étuis bordés de jaune.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

S. niger, elytris fuscis margine flavo.

Loc. Habitat arva.

20. *S. maculatus*.

Le Staphylin noir à taches jaunes.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

S. niger; thorace utrinque, singuloque elytro, maculâ flavâ.

Loc. Idem.

21. *S. riparius.*

*Le Staphylin rouge à tête noire
& étuis bleus.*

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. rufus, elytris cœruleis, capite abdominique apice nigris.

Loc. Habitat arenam humidam.

22. *S. rufus.*

*Le Staphylin jaune à tête, étuis
& anus noirs.*

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

S. flavus, capite, elytris abdomineque pone nigris.

Loc.

23. *S. thoracicus.*

Le Staphylin noir à corcelet rouge.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. atro-cœrulescens, thorace rubro.

Loc.

24. *S. biguttatus.*

Le Staphylin junon.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. ater, oculis prominentibus crassis.

Varietas A. Id. elytro singulo puncto flavo.

Loc. Habitat arenam.

25. *S. clavicornis.*

Le Staphylin à antennes en demi-massues.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. antennis subclavatis.

Loc.

* 26. *S. melanophthalmos.*

Le Staphylin fauve aux yeux noirs.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. pallidus, oculis anoque nigris, antennis subclavatis.

Loc.

* 27. *S. elongatus.*

Le Staphylin noir à bandes de points.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger nitens, elytris punctatis, thorace elongato lævi, striis quatuor punctatis.

Loc.

- * 28. *S. angustatus.*

Le Staphylin à corcelet étranglé.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger, thorace angustato fulvo, pedibus fuscis.

Loc.

- * 29. *S. variegatus.*

Le Staphylin applati à étuis bigarrés.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

S. niger compressus, elytris postice pedibusque fuscis.

Loc.

- * 30. *S. arenarius.*

Le Staphylin à étuis jaunes au milieu.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. ater, elytris in medio flavescentibus.

Loc.

- * 31. *S. melonocephalus.*

Le Staphylin à tête noire.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. fulvus, capite anoque nigris.

Loc.

* 32. S. nigro-fulvus.

Le Staphylin arlequin à longues mâchoires.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. niger, thorace pedibus elytrorum abdominisque basi fulvis, apice nigris, maxillis longitudine capitis.

Loc.

* 33. S. cupreus.

Le Staphylin cuivreux.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. æneus punctatus, elytris veluti tessellatis.

Loc.

ORDO SECUNDUS.

Caract. ordinis II.

Tarforum articuli quatuor.

LI. NECYDALIS. LA NECYDALE.

Antennæ filiformes.

Alæ nudæ.

H iij

1. *N. punctata.*

La Necydale à points jaunes.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

N. elytris apice puncto flavo.

Varietas A. Necydis elytris apice puncto flavo, thorace luteo.

B. Necydis elytris apice puncto flavo, thorace nigro.

Loc. Habitat folia ilicis.

* 2. *N. major.*

La grande Necydale.

Long. 9 lig. Larg. $1 \frac{2}{3}$ lig.

N. elytris ferrugineis immaculatis, antennis corpore brevioribus.

Loc.

ORDO TERTIUS.

Caract. ordinis III.

Tarforum articuli tres.

LII. FORFICULA. *LE PERCE-OREILLE.*

Antennæ filiformes.

Alæ testæ.

Abdomen forficibus armatum.

1. *F. auricularia.*

Le grand Perce-oreille.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig.

F. antennarum articulis quatuordecim.

Loc. Habitat hortos, gramina, flores.

2. *F. minor.*

Le petit Perce-oreille.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

F. antennarum articulis undecim.

Loc. Habitat arenam humidam.

ORDO QUARTUS.*Caract. ordinis IV.*

Tarforum primi & secundi pedum paris articuli quinque, pedum vero posteriorum articuli quatuor.

LIII. MELOE. *LE PROSCARABÉ.*

Antennæ à medio ad basim & apicem decrescentes,

Alæ nullæ.

1 M. proscarabeus.

Le Proscarabé.

Long. 10, 11 lig. Larg. 5 lig.

Loc. Habitat hortos.

ARTICULUS TERTIUS.

Caraçt. articuli III.

Coleoptra mollia membranacea.

ORDO PRIMUS.

Caraçt. ordinis I.

Tarforum primi & secundi pedum paris articuli quinque, pedum vero posteriorum articuli quatuor.

LIV. BLATTA. *LA BLATTE.*

Antennæ filiformes.

Ad ani latera apendices vesiculosi transversim sulcati.

1. B. orientalis.

La Blatte des cuisines.

Long. 9 lig. Larg. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

B. ferrugineo-fusca, elytris sulco ovato impressis, abdomine brevioribus.

Loc. Habitat loca calida domorum; farinam.

2. B. Aurelianensis.

La grande Blatte.

Long. 15 lig. Larg. 5 lig.

H v

B. fusco-flavescens, elytris sulco ovato impressis, abdomine longioribus.

Loc. Habitat agrum Aurelianensem.

3. B. laponica.

La Blatte jaune.

Long. 3 $\frac{1}{2}$, 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

B. flavescens, elytris ad angulum acutum striatis.

Loc. Habitat farinam.

ORDO SECUNDUS.

Caract. Ordin. II.

Tarforum articuli duo.

LV. TRIPS. *LE TRIPS.*

Antennæ filiformes.

Os rimulâ longitudinali.

Tarsi vesiculosi.

1. T. juniperina.

Le Trips à pointe.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{6}$ lig.

T. elytris albidis, corpore nigro, abdominali setâ.

Loc. Habitat cortices arbor. vetustas.

2. *T. physapus.**Le Trips noir des fleurs.*Long. $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{10}$ lig.*T. elytris glaucis, corpore atro.**Loc. Habitat flores compositos.*3. *T. fasciata.**Le Trips à bandes.**T. elytris albis nigrisque fasciis, corpore atro.**Loc. Idem.*

ORDO TERTIUS.

Caract. Ordin. III.

Tarforum articuli tres.

LVI. GRILLUS. *LE GRILLON.*

Antennæ filiformes.

Cauda bifida.

Ocelli tres.

1. *G. grillo-talpa.**La Courtillière ou le Gaupe-Grillon.*

Long. 18 lig. Larg. 4 lig.

H vj

G. pedibus anticis palmatis.

Loc. Habitat humum recentem , horticolis infestus.

2. G. domesticus.

Le Grillon.

Long. 1 pouce. Larg. 4 lig.

G. pedibus anticis simplicibus.

Loc. Habitat loca calida domorum & arva.

LVII. ACRYDIUM. *LE CRIQUET.*

Antennæ filiformes corpore dimidio breviores.

Ocelli tres.

1. A. cyaneum.

Le Criquet à aîles bleues.

Long. 1 pouce. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

A. elytris fuscis , alis subcœruleis.

Loc. Habitat arva sicca.

2. A. cœrulescens.

Le Criquet à aîles bleues & noires.

Long. 1 pouce. Larg. 3 lig.

A. elytris nebulosis, alis cœruleis extremo nigro.

Loc. Habitat prata.

3. A. stridulum.

Le Criquet à ailes rouges.

Long. 1 lig. Larg. 1 lig.

A. elytris nebulosis, alis rubris extremo nigris.

Loc. Habitat vineas.

4. A. grossum.

Le Criquet ensanglanté.

Long. 5, 10, 11 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 3 lig.

A. femoribus sanguineis, alis subfuscis reticulatis.

Loc. Habitat arva.

5. A. bi-punctatum.

Le Criquet à capuchon.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

A. elytris nullis, thorace producto abdomini æquali.

Loc. Idem.

6. A. subulatum.

*Le Criquet à corcelet allongé.*Long. 5 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

A. elytris nullis, thorace producto abdomine longiore.

Loc. Habitat arva.

ORDO QUARTUS.

Caract. Ordin. IV.

Tarforum articuli quatuor.

LVIII. LOCUSTA. *LA SAUTERELLE.*

Antennæ filiformes corpore longiores.

Ocelli tres.

1. L. viridissima.

*La Sauterelle à sabre.*Long. 11 lig. Larg. $2 \frac{1}{2}$ lig.

L. caudâ ensiferâ curvâ.

Loc. Habitat arva & prata.

2. *L. vermivora.**La Sauterelle à coutelas.*

Long. 22 lig. Larg. 3 lig.

*L. caudâ enfiferâ rectâ.**Loc. Habitat arva & prata.*

ORDO QUINTUS.*Caract. Ordin. V.*

Tarforum articuli quinque.

LIX. MANTES. *LA MANTE.*

Antennæ filiformes.

1. *M. gongylodes.**La Mante.*

Long. 2 pouces. Larg. 5, 6 lig.

Loc. Habitat agrum Aurelianensem.

SECUNDA SECTIO INSECTORUM.

INSECTA HEMIPTERA.

Caractères sectionis.

Alæ superiores elytris accedentes.
Os sub thorace inflexum.

IX. CICADA. *LA CIGALE.*

Articuli tarforum tres.

Antennæ capite breviores.

Ocelli duo.

Rostrum inflexum.

Alæ quatuor, inferiores cruciatæ.

1. *C. nervosa.*

La Cigale à ailes transparentes.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{4}$ lig.

C. fusca, alis aqueis fusco maculatis;
nervis punctatis.

Loc. Habitat plantas & gramina.

2. *C. spumaria.*

La Cigale bedeaude.

Long. 4 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

C. fusca, elytris fasciâ duplici interruptâ transversâ albidâ.

Loc. Habitat prata & medicaginem.

3. C. lateralis.

La Cygale à bordure.

Long 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{5}$ lig.

C. nigra, elytrorum lateribus albis.

Loc. Idem.

4. C. membranacea.

La Cigale à aîles membraneuses.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. fusco-pallida, elytris membranaceis venosis, scutello maculâ duplici triangulari.

Loc. Idem.

5. C. viridis.

La Cigale verte à tête panachée.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

C. elytris viridibus, capite flavo punctis nigris.

Loc. Idem.

6. C. sanguinea.

La Cigale à taches rouges.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

C. nigra, elytris maculis sex rubris.

Loc. Habitat prata & medicaginem; rarior.

7. *C. gibbosa*.

La Cigale bossue.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C. fusco-viridis reticulata, alarum basi dilatata.

Loc. Id. rara.

8. *C. pallida*.

La Cigale pâle.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. flavo-pallida, thorace punctis sex impressis.

Varietas A. Cicada flavo-pallida, oculis nigricantibus.

B. Cicada flavo-pallida, dorso lineâ longitudinali nigra.

C. Cicada flavo-pallida, thoracis posticâ, scutelli antericâ parte, fuscis.

Loc. Idem.

9. *C. interrupta*.

La Cigale jaune à raies noires obliques.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. elytris flavis , lineâ abruptâ duplici longitudinali nigrâ.

Loc. Idem.

10. C. regalis.

La Cigale à diadème.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. fusca , capitis thoracisque fasciâ transversâ flavâ.

Loc. Idem.

11. C. torquata.

La Cigale à collier jaune.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. fusco-nebulosa , scutelli cavitate rotundâ , thorace punctis luteis impressis transversim positis.

Loc. Idem.

12. C. variegata.

La Cigale à pattes bigarées.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. fusco-nebulosa , scutello transversim sulcato , tibiis posticis , elytrorumque limbo è flavo fuscoque variegatis.

Loc. Idem.

13. *C. marginata.**La Cigale à tête & bordure jaune.*Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.*C. fusco-nebulosa*; capite, thoracis antica parte, elytrorumque limbo flavis.*Loc.* Habitat prata & medicaginem.14. *C. venosa.**La Cigale à veines blanches.*Lon. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*C. fusco-nebulosa punctata*, nervis elytrorum albidis.*Loc.* Idem.15. *C. nigra.**La Cigale noire.*Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.*C. tota nigra.**Loc.* Habitat castaneas.16. *C. fasciolata.**La Cigale noire à bandes jaunes sur le corcelet.*

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. nigra, thorace elytrisque fasciâ croceâ.*Loc.* Habitat prata.

17. *C. aurita.**Le grand Diable.*

Long. 7 lig. Larg. 2 lig.

*C. thorace obtuse bicorni.**Loc.* Habitat prata; rarissima.18. *C. cornuta.**Le petit Diable.*Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.*C. thorace acute bicorni, pone producto.**Loc.* Habitat in sylvis filicem, cirsum, saltator.19. *C. infernalis.**Le demi-Diable.*Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*C. thorace inermi pone producto.**Loc.* Rar. in agro lutetiano; in Campaniâ frequens.20. *C. striata.**La Cigale rayée.*Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*C. elytris albido nigroque striatis ad angulum acutum suturæ dorsalis.**Loc.*

21. *C. trifasciata*.*La Cigale à 3 bandes brunes.*Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*C. fusca*, elytris albidis, fasciis tribus transversis fuscis.*Variet. A.* Eadem elytris unicoloribus, thorace antice punctorum nigrorum fasciâ transversâ.*Loc.*22. *C. transversalis*.*La Cigale à deux bandes brunes.*Long. $1 \frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*C. flava*, elytrorum fasciis duabus transversis fuscis.*Loc.* Habitat arbores.23. *C. cœca*.*La Cigale jaune aux yeux noirs.*Long. $1 \frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*C. flava compressa*, oculis nigris.*Loc.*24. *C. flammigera*.*La Cigale flamboyante.*Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. flava, fasciâ duplici longitudinali rubrâ undulatâ.

Loc. Habitat domos.

25. C. carpini.

La Cigale verte à points noirs.

C. viridi-flava, elytris punctis tribus nigris, apice fuscis.

Loc. Habitat folia arborum.

26. C. geographica.

La Cigale géographique.

C. viridis, elytris maculis plurimis fuscis ovatis.

Loc. Idem.

27 C. ulmi.

La Cigale moucheron verte.

C. alis viridi-luteis apicibus nigrantibus deauratis.

Loc. Habitat folia ulmi.

28. C. rosæ.

La Cigale des charmilles.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

C. flava , alis albis apicibus membranaceis.

Loc. Habitat arbores & rosam.

* 29 C. nervoptera.

La Cigale à nervures.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. fusca , thoracis margine flavo ; alis aqueis nervis fuscis.

Loc.

* 30. C. acephala.

La Cigale verte à tête renforcée.

Long. 2 , 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$, 1 lig.

C. tota viridis , capite brevi lato.

Loc.

* 31. C. tristis.

La Cigale à bandes blanches.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. nigro-fusca , fasciis quatuor transversis albis , mediâ interruptâ.

Loc.

* 32. C. porrecta.

La Cigale à tête allongée.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C.

C. pallida, oculis nigris, capite antice
producto acuto, thorace duplo longiori.

Loc.

* 33. C. dilatata.

La Cigale renflée.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{4}$ lig.

C. fusca, maculis irregularibus albis,
elytrorum lateribus dilatatis.

Loc.

CICADA. (1) TETIGONIA nostras.

LA CIGALE. LA PROCIGALE.

Antennæ capite breviores,
setaceæ, articulis quinque.

Ocelli tres.

Rostrum inflexum.

Alæ quatuor laterales.

Articuli tarforum tres.

Antennæ capite breviores,
articulis duobus globoso & setaceo.

Ocelli duo.

Rostrum inflexum.

Alæ quatuor, inferiores cruciatæ.

Articuli tarforum tres.

(1) Adduntur hîc caracteres *Cicadæ veræ* Gallo-provincialis, nostræ *Cicadæ Tetigonia* vocatæ oppositi.

Annumerantur duæ præcipuæ *Cicadæ* veræ species Gallo-provinciam habitantes, quæ in musæis nostris frequentissime asservantur.

1. *La Cigale à bordure jaune.*

C. fusca, thoracis & scutellis margine flavo, alis nervosis.

Loc. Habitat Gallo-provinciam.

2. *La Cigale panachée.*

C. fusca, thorace scutelloque flavis, variegatis, alis nervoso-punctatis.

Loc. Habitat Gallo-provinciam.

LXI. CIMEX. *LA PUNAISE.*

Articuli tarforum tres.

Antennæ capite longiores articulis quatuor vel quinque.

Rostrum inflexum.

Alæ quatuor, superiores semi-elytra.

FAMIL. I. *Antennarum articuli*
quatuor.

1. C. lectularius.

La Punaise des lits.

C. apterus.

Loc. Habitat lecta.

2. C. scutellatus.

*La Punaise cuirasse.*Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.C. hemisphericus nigro-æneus, scutello
totum abdomen tegente, amplissimo.Loc. Habitat viciniam multifloram fontis Bella-
quæi.

3. C. testudinarius.

*La Punaise tortue brune.*Long. 3 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.C. fuscus, scutello totum abdomen te-
gente, amplissimo.

Loc. Habitat sylvas.

4. C. personatus.

La Punaise mouche.

Long. 7, 8 lig. Larg. 2 lig.

I ij

C. oblongus niger, rostro arcuato, antennis apice capillaceis, elytris membranaceis.

Loc. Habitat domos.

5. C. annulatus.

La Punaise mouche à pattes rouges.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus niger, rostro arcuato, elytris membranaceis, pedibus abdomineque rubro nigroque variegatis.

Loc. Habitat sylvas.

6. C. bidentatus.

La Punaise porte-épine.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

C. longus, fuscus, rostro arcuato, thorace subtus antice bidentato.

Loc. Habitat plantas, rarus.

7. C. pellucidus.

La Punaise brune à étuis transparents.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, fusco-niger, pedibus pallidis, elytris pellucidis apice fusco.

Loc.

8. C. boopis.

La Punaise marbrée aux gros yeux.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, luteo nigroque marmoratus, oculis crassissimis.

Loc.

9. C. leviatan.

La Punaise leviatan.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. planus, fuscus, thorace elytrisque alatis, capite antice cornuto, antennis brevibus crassis.

Loc.

10. C. eryngii.

La Punaise rouge à taches triangulaires.

Long. $3 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{4}$ lig.

C. oblongus niger, thorace elytrisque rubris, elytrorum extremo maculâ triangulari nigrâ.

Loc. Habitat folia Eryngii.

11. *C. apterus.*

La Punaise rouge des jardins.

Long. 3 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, rubro nigroque variegatus, elytris maculâ rotundâ, punctuloque nigris.

Loc. Habitat arborum infimam partem, multiplex.

12. *C. hyosciami.*

La Punaise rouge à croix de chevalier.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. oblongus, rubro nigroque variegatus, scutelli nigri apice rubro.

Loc. Habitat folia hyosciami.

13. *C. stellifer.*

La Punaise rouge à base des aîles blanches.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus, rubro nigroque variegatus, centro crucis albo.

Loc. Habitat hortos.

14. C. equestris.

*La Punaise rouge à bandes noires
& taches blanches.*

Long. 5 lig. Larg. $1 \frac{3}{4}$ lig.

C. oblongus, rubro nigroque variegatus,
elytris fasciâ nigrâ, alis fuscis macu-
lis albis.

Loc.

15. C. nobilis.

*La Punaise rouge à point noir
& taches blanches.*

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{4}$ lig.

C. oblongus, rubro nigroque variegatus,
elytris punctulo nigro, alis fuscis ma-
culis albis.

Loc.

16. C. tessellatus.

La Punaise rouge à damier.

Long. 4 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, thorace nigro lineis tribus
rubris, elytris rubro nigroque tesse-
latis, limbis nigris.

Loc. In Campaniâ multiplex.

17. *C. croceus*.*La Punaise safranée.*Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{3}$ lig.*C. croceus*, elytrorum apice rubro, alis nigris, antennarum articulo secundo clavato.*Variet. A.* *Cimex niger*, pedibus rufis, antennarum articulo secundo clavato.*B.* *Cimex niger*, capite, thorace pedibusque rufis, antennarum articulo secundo clavato.*Loc.*18. *C. gothicus*.*La Punaise rougeâtre à antennes incarnat.*Long. $3 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{3}{4}$ lig.*C. oblongus*, fusco-ruber, elytris apice sanguineis, antennarum articulo secundo longissimo incarnato.*Loc.*19. *C. variegatus*.*La Punaise à brocard jaune.*Long. 4 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. 2 lig.

C. oblongus niger, thoracis lateribus scutelloque flavis, elytris antennis pedibusque flavo-variegatis.

Loc.

20. C. marginatus.

La Punaise à aîlerons.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, fuscus, immaculatus, thorace utrinque obtuse angulato, capite prope antennas externe denticulato.

Loc.

21. C. rostratus.

La Punaise à bec.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, fuscus, immaculatus, thorace utrinque obtuse angulato, capite inter antennas bidentato.

Loc.

22. C. acutus.

La Punaise brune à corcelet pointu & lisse.

Long. 9 lig. Larg. 2 lig.

C. oblongus rufus, immaculatus, thorace utrinque acute angulato, margine lævi.

Loc.

23. C. fimbriatus.

La Punaise brune à corcelet pointu & épineux.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, rufus, immaculatus, thorace utrinque acute angulato, margine spinoso.

Loc.

24. C. chelifer.

La Punaise à pattes de crabes.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus fuscus, pedibus primi paris cheliformibus.

Loc. Habitat sylvas.

25. C. fabulosus.

La Punaise à nervures pointillées.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus, viridi-fuscus, elytrorum nervis punctatis, antennis rufis.

Loc.

26. C. monilis.

La Punaise brune à antennes & pattes panachées.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. oblongus, fuscus, antennis, pedibus abdominisque marginibus nigro luteoque variegatis.

Loc.

27. C. cathariæ.

La Punaise grise panachée de noir.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus, cinereo nigroque variegatus, alis glaucis.

Loc. Habitat labiatis, præcipue cathariam.

28. C. crucifer.

La Punaise grise porte-croix.

C. oblongus niger, thorace postice cinereo, elytris cinereis, maculâ nigrâ, alisque nigris.

Loc. Habitat arida loca.

29. *C. apicaris.*

*La Punaise brune à pointe des
étuis blanche.*

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus niger, thorace postice cinereo, elytris fuscis apice albo.

Loc.

30. *C. femoralis.*

*La Punaise verdâtre à cuisses
pointillées.*

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, pallide-viridescens, femoribus nigro-punctatis.

Loc.

31. *C. constellaris.*

*La Punaise noire à taches fauves
& ailes panachées.*

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus, niger, elytris antice rufis, alis albo maculatis.

Loc. Habitat cortices arborum.

32. *C. fuliginus.**La Punaise brune ponctuée.*Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.*C. oblongus*, atro-fuscus punctatus, alis venosis.*Loc.*33. *C. pratensis.**La Punaise gris-fauve porte-cœur.*

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. griseus, scutello maculâ cordatâ flavâ, elytris apice puncto fusco.*Loc.*34. *C. campestris.**La Punaise verte porte-cœur.*Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*C. oblongus*, viridis, scutello maculâ cordatâ viridi, elytris maculâ ferrugineâ.*Varietas A.* *Cimex oblongus*, fusco-luteus, scutello maculâ cordatâ viridi, elytris fasciâ duplici fuscâ.*Loc.* Habitat flores.

35. *C. cordatus.*

La Punaise porte-cœur à taches jaunes au bout des étuis.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, fusco-ruber, scutello maculâ cordatâ luteâ, elytris apice luteis.

Loc.

36. *C. porrectus.*

La Punaise jaune à antennes droites.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus, flavescens, thorace fasciis duabus nigris, scutello maculis flavis, antennis antice porrectis.

Loc.

37. *C. ternatus.*

La Punaise à trois taches.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. oblongus niger, thorace fasciis tribus flavis, scutello elytrorumque apice maculis luteis.

Loc.

38. *C. striatus.*

La Punaise rayée de jaune & de noir.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus niger, thorace fasciis tribus flavis, scutello nigro, elytris flavis apice fulvo.

Loc.

39. *C. nigro-punctatus.*

La Punaise jaune à corcelet tacheté & étuis verts.

Larg. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus viridi-flavus, capite thoraceque nigro maculatis, elytris viridibus.

Loc.

40. *C. viridescens.*

La Punaise verdâtre à tache brune.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus viridis, elytrorum maculâ fuscâ.

Loc.

41. *C. albinus.*

La Punaise verdâtre à taches blanches.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

*C. oblongus viridis, elytrorum apice al-
bido, scutello lineolâ fuscâ.*

Loc.

42. *C. elongatus.*

La Punaise verdâtre à bande brune.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

*C. oblongus viridis, thorace scutelloque
lineis quatuor nigris, elytris interne
fuscis.*

Loc.

43. *C. ærugineus.*

La Punaise verte aux yeux bruns.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. oblongus, totus viridis, oculis fuscis.

Loc.

44. *C. cruentatus.*

La Punaise verte ensanglantée.

Long. 3 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus viridis, elytrorum lineis sanguineis.

Loc.

45. C. ruficornis.

La Punaise verte à antennes fauves.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, pallido-viridis, antennis setaceis rufis.

Loc.

46. C. lateralis.

La Punaise blanchâtre aux yeux noirs.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. longus albidus, oculis nigris.

Loc.

47. C. recticornis.

La Punaise verte à antennes droites.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. longus totus viridis antennis antice porrectis.

Loc.

48. *C. sponsalis.*

La Punaise pâle à tache noire sur l'écusson.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. longus, albidus, oculis fuscis scutello maculâ nigrâ.

Loc.

49. *C. conicus.*

La Punaise grise conique.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

C. oblongus conicus, fusco - cinereus, oculis prominentibus, elytris nervosis.

Loc. Habitat hortos.

50. *C. flammeus.*

La Punaise noire à pointe des étuis rouges.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. oblongus niger, capite, elytrorum apice, genibusque ferrugineo-rubris.

Loc.

51. C. rolandri.

La Punaise couleur de suie à ailes jaunes.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus atro-fuscus, alarum maculâ flavâ.

Loc.

52. C. plæffæus.

La Punaise noire à pattes panachées.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus niger, pedibus viridi nigroque variegatis.

Loc.

53. C. atramentarius.

La Punaise toute noire.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus totus ater, alis atris.

Loc.

54. C. ater.

La Punaise à grosses antennes terminées par un fil.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus ater, antennis setâ terminatis.

Loc. Habitat sylvas.

§ 55. *C. carthusianus*.

La Punaise chartreuse.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. oblongus, infra niger, supra albolacteus, antennis crassis antice porrectis, capite pedibus antennisque nigris.

Loc. Habitat Eryngium.

§ 56. *C. clavicornis*.

La Punaise tigre.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. ex albo fuscoque cinereus, elytrorum thoracisque margine punctato antennis subclavatis.

Loc. Larva flores chamædrys distendit.

§ 57. *C. appendiceus*.

La Punaise à fraise antique.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

C. antennis clavatis, thorace elytrisque corpore multo latioribus diaphanis, reticulatis, fasciâ duplici transversâ.

Loc.

58. *C. vagabundus.**La Punaise culiciforme.*Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.*C. linearis* pedibus anticis brevissimis, coeteris antennisque filiformibus longissimis, albo fuscoque variis.*Loc.* Habitat arbores.59. *C. lacustris.**La Punaise nayade.*Long. 4 lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.*C. linearis* supra niger, pedibus anticis brevissimis.*Loc.* Habitat aquarum stagnantium superficiem.60. *C. stagnorum.**La Punaise aiguille.*Long. 5 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.*C. linearis* nigricans compressus, capite cylindraceo, pedibus anticis brevissimis.*Loc.* Habitat stagna.

FAMIL. II. *Antennarum articuli quinque.*61. *C. juniperinus.**La Punaise verte.*Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 $\frac{1}{2}$ lig.*C. subrotundus viridis.**Loc.* Fetidissimus, habitat grossulariam.* 62. *C. tridentatus.**La Punaise à trois cornes.*Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.*C. planus, depressus, atro-fuscus, capite antice tridentato, thoracis margine ferrato, elytris parvis.**Loc.*63. *C. carminaris.**La Punaise verte lavée de rouge.*Long. 6 lig. Larg. 3 $\frac{1}{2}$ lig.*C. ovatus, thorace obtuse angulato, à viridi rubroque nebulosus.**Loc.** 64. *C. biclavatus.**La Punaise à double masse.*Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus lividus, antennarum articulo primo & extremo clavatis.

Loc.

65. C. pungens.

La Punaise verte à pointes du corcelet rouges.

Long. 6 lig. Larg. 3 fig.

C. subovatus viridis, angulis thoracis acutis rubris apice nigris, abdomine subtus acuto.

Loc.

66. C. baccarum.

La Punaise brune à antennes & bords panachés.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

C. fuscus, antennis abdominisque margine nigro croceoque variegatis.

Loc. Habitat grossulariam, fetidus.

67. C. annularis.

La Punaise brune à pattes panachées.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. fuscus, pedibus abdominisque limbe
luteo fusco variegatis.

Loc.

68. C. secalinus.

La Punaise porte-chappe brune.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

C. nigro-ferrugineus, scutello ad anum
usque producto.

Loc. Habitat secale & gramina.

69. C. cappatus.

La Punaise porte-chappe noire.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 lig.

C. ater punctatus, scutello ad anum usque
producto.

Loc. Habitat domos.

70. C. italicus.

La Punaise siamoise.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

C. rotundatus ruber, supra fasciis lon-
gitudinalibus, infra punctis nigris,
scutello amplo totum fere abdomen
tegente.

Lec.

71. *C. ornatus.**La Punaise rouge du chou.*Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 lig.*C. rotundato-ovatus, nigro rubroque variegatus, capite alisque nigris.**Loc. Habitat brassicam.*72. *C. carbonarius.**La Punaise noire.*Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.*C. ovatus, totus niger, alis pallidis.**Loc.*73. *C. fumosus.**La Punaise brune luisante.*Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.*C. ovatus, fusco-niger, alis pallidis.**Loc.*74. *C. limbosus.**La Punaise noire à bordure blanche.*

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

*C. ovatus niger, elytrorum limbo exteriore albo.**Loc.*

75. *C. bicolor.*

La Punaise noire à quatre taches blanches.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

C. ovatus niger, thoracis lateribus, elytrorumque maculis quatuor albis.

Loc.

76. *C. oleraceus.*

La Punaise verte à raies & taches rouges ou blanches.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

C. ovatus cœrulescenti-æneus, thorace lineolâ, scutelli apice, elytrisque puncto albo rubrove.

Loc.

77. *C. cœruleus.*

La Punaise verte bleuâtre.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. ovatus, viridi-cœruleus æneus.

Loc.

78. *C. saltator.*

La Punaise sauteuse.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. rotundato-ovatus niger, capite genubusque ferrugineis, pedibus saltatoriis.

Loc.

79. C. acuminatus.

La Punaise à tête allongée.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. ovatus, antice attenuatus, fasciis longitudinalibus cinereo - exalbidis, antennis extremo rufis.

Loc.

LXII. NAUCORIS. *LA NAUCORE.*

Articuli tarforum duo.

Antennæ brevissimæ infra oculos positæ.

Rostrum inflexum.

Alæ quatuor cruciata.

Pedes sex, primi cheliformes.

Scutellum præfens.

1. N. cimicoides.

La Naucore.

Long. 4, 5 lig. Larg. 3 lig.

Loc. Habitat aquam.

LXIII. NOTONECTA. *LA PUNAISE A AVIRONS.*

Articuli tarforum duo.

Antennæ brevissimæ infra oculos positæ.

Rostrum inflexum.

Alæ quatuor cruciatæ.

Pedes sex natatorii.

Scutellum præsens.

1. *N. glauca.*

La grande Punaise à avirons.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

N. capite luteo, elytris fusco croceoque variegatis, scutello atro.

Loc. Habitat aquam.

2. *N. minutissima.*

La petite Punaise à avirons.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

N. cinerea anelytra.

Loc. Idem.

LXIV. CORIXA. *LA CORISE.*

Articulus tarforum unicus.

Antennæ brevissimæ infra oculos
positæ.

Rostrum inflexum.

Alæ quatuor cruciatæ.

Pedes sex, primi cheliformes, pos-
tici natatorii.

Scutellum nullum.

1. C. striata.

La Corise.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

Loc. Habitat rivulos & stagna, fetidissima.

LXV. HEPA. *LE SCORPION AQUA-
TIQUE.*

Articulus tarforum unicus.

Antennæ cheliformes.

Rostrum inflexum.

Alæ quatuor cruciatæ.

Pedes quatuor.

K iij

1. *H. linearis.*

Le Scorpion aquatique à corps allongé.

Long. 13 lig. Larg. 1 lig.

H. corpore lineari.

Loc. Habitat aquam stagnantem.

2. *H. cinerea.*

Le Scorpion aquatique à corps ovale.

Long. 8, 9 lig. Larg. 3 lig.

H. corpore ovato.

Loc. Idem.

LXVI. PSYLLA. *LA PSYLLE.*

Articuli tarforum duo.

Rostrum pectorale inter primum & secundum par femorum.

Alæ quatuor laterales.

Pedes saltatorii.

Abdomen acuminatum.

Ocelli tres.

1. *P. ficûs.*

La Psylle du figuier.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

P. fusca, antennis crassis pilosis, alarum nervis fuscis.

2. P. chermes buxi.

La Psylle du buis.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

P. viridis, antennis setaceis, alis fusco-flavescentibus.

3. P. ulni.

La Psylle de l'aune.

P. viridis, antennis setaceis, alis aqueis.

4. P. fraxini.

La Psylle du frêne.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

P. nigro luteoque variegata; alarum oris in apice fuscis.

5. P. abietis.

La Psylle du sapin.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

P. pallidè flavescent, oculis fuscis, alis aqueis.

6. *P. pini*.

La Psylle du pin.

Long.

Larg.

P. lanata pini.

7. *P. lapidum*, feu *lichenis*.

La Psylle des pierres.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

P. fusca, nigro punctata, antennis corpore longioribus, alis nervosis fusco maculis.

8. *P. fusca*.

La Psylle brune à antennes sétacées & ailes nerveuses.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

P. fusca, antennis setaceis lævibus, alis nervosis.

9. *P. rubra*.

La Psylle rouge.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

P. rubra, alis nervosis.

Loc.

LXVII. APHIS. *LE PUCERON.*

Articulus tarsorum unicus.

Rostrum inflexum.

Alæ quatuor erectæ vel nullæ.

Pedes ambulatorii.

Abdomen bicornæ.

1. A. ulmi.

Le Puceron de l'orme.

A. ulmi.

2. A. fraxini.

Le Puceron du frêne.

A. fraxini , nigro viridique variegata.

3. A. sambuci.

Le Puceron du sureau.

A. sambuci tota cœruleo-atra.

4. A. roboris.

Le Puceron du chêne.

A. quercûs atro-fusca.

5. A. aceris.

Le Puceron de l'érable.

A. aceris, viridis, maculis nigris.

6. *A. tilia*.

Le Puceron du tilleul.

A. tilia, alis, antennis, pedibusque nigro punctatis.

7. *A. betula*.

Le Puceron du bouleau.

A. betula, marginibus incisurarum abdominis punctis nigris.

8. *A. tanacet*.

Le Puceron de la tanaïse.

A. tanacet fusca, abdomine nigro-coeruleo antice viridi.

9. *A. acetosa*.

Le Puceron de l'oseille.

A. acetosa, atra fasciâ transversâ viridi.

10. *A. padi*.

Le Puceron du prunier.

A. pruni.

11. *A. burfaria.*

Le Puceron du peuplier noir.

A. populi nigra lanata.

12. *A. fagi.*

Le Puceron du hêtre.

A. fagi lanata.

13. *A. lactucæ.*

Le Puceron du laiteron.

A. sonchi caudata.

14. *A. quercûs.*

Le Puceron des écorces à longues trompes.

A. fusca proboscide corpore triplo longiore.

LXVIII. CHERMES *LE KERMÈS.*

Rostrum pectorale inter primum & secundum par femorum.

Alæ duæ masculis, erectæ.

Abdomen appendicibus setaceis.

Fœmina folliculi formam induens.

1. *C. polonicus.*

Le Kermès des racines.

C. radicum purpureus.

Loc. Habitat polygoni Knawel radices.

2. *C. hesperidum.*

Le Kermès des orangers.

C. hesperidum.

3. *C. clematitis.*

Le Kermès de la clematite.

C. clematitis oblongus.

4. *C. persicæ.*

Le Kermès oblong du pêcher.

C. persicæ oblongus.

5. *C. amygdali.*

Le Kermès rond du pêcher.

C. persicæ rotundus.

6. *C. vitis.*

Le Kermès de la vigne.

C. vitis oblongus.

6. *C. abietis.**Le Kermès du sapin.**C. abietis rotundus.*8. *C. ulmi.**Le Kermès de l'orme.**C. ulmi rotundus.*9. *C. tilia.**Le Kermès du tilleul.**C. tilia hemisphaericus.*10. *C. coryli.**Le Kermès du coudrier.**C. coryli hemisphaericus.*11. *C. quercus.**Le Kermès rond & brun du chêne.**C. quercus rotundus fuscus.*12. *C. roboris.**Le Kermès du chêne rond & de
couleur panachée.**C. quercus rotundus, ex albo flavescente
nigroque variegatus.*

13. *C. reniformis.*

Le Kermès reniforme du chêne.

C. quercûs reniformis.

14. *C. sericeus.*

Le Kermès ovale & cotonneux du chêne.

C. quercûs oblongus serico albo.

15. *C. carpini.*

Le Kermès cotonneux du charme.

C. carpini serico albo.

16. *C. mespili.*

Le Kermès cotonneux du nespier.

C. mespili serico albo.

17. *C. linearis.*

Le Kermès en écaille de moule.

C. arborum linearis.

18. *C. aceris.*

Le Kermès ovale de l'érable.

C. aceris ovatus.

LXIX. COCCUS. *LA COCHENILLE.*

Rostrum pectorale inter primum &
secundum par femorum.

Alæ duæ masculis, erectæ.

Abdomen appendicibus setaceis.

Fæmina insecti formam servans.

1. *C. adonidum.*

La Cochenille des serres.

C. adonidum, corpore roseo, farinaceo,
alis fetisque niveis.

2. *C. phalaridis.*

La Cochenille du chien-dent.

C. graminis corpore roseo.

3. *C. ulmi.*

La Cochenille de l'orme.

C. ulmi, corpore fusco, serico albo.

Finis primæ Partis.